

Obkroži pravilne odgovore. Možnih je od 0 do 5 pravih odgovorov:

1. Endometrioza:

- gre za pojav ektopičnega endometrija
- predstopnja raka endometrija
- odsotnost endometrija v maternici
- če je v miometriju, gre za adenomiozo
- redka spolno prenosljiva bolezen

2. Descensus uteri pomeni:

- pomaknjenost maternice navzpred
- upognjenost maternice navzad
- odklon maternice v stran
- znižano maternico
- dvignjeno maternico

3. Dismenoreja pomeni:

- bolečine pri odnosih
- prepogoste menstruacije
- bolečine ob perilu
- močne krvavitve
- izostanek perila

4. Dojka je:

- simetričen paren organ
- organ, ki ga imajo samo ženske
- organ, ki ga imajo ženske in moški
- organ, ki ga imajo vsi sesalci
- organ, ki ni hormonsko odvisen

5. Dojko sestavljajo:

- maščevje
- vezivno tkivo
- hrustanec
- žlezno tkivo
- koža

6. Miomi:

- so maligni tumorji maternice
- so tumorji gladkomišičnega in vezivnega tkiva
- nastanejo zaradi lokalnega draženja materničnega vložka
- so vzrok za neplodnost in močnejše menstrualne krvavitve
- med drugim jih zdravimo tudi z obsevanjem

7. VIN so intraepitelne neoplazme:

- vratu maternice

- vulve
- vezivnega tkiva
- dojke
- vagine

8. Uhajanje vode imenujemo:

- urinska inkompetenca
- urinska impotenca
- urinska inkontinenca
- urinska inapetenca
- nič od navedenega

9. Kadar govorimo o vnetju spodnjega dela genitalnega trakta mislimo na

vnetje:

- materničnega telesa
- vulve
- vagine
- jajcevodov in jajčnikov
- vratu maternice

11. Prva porodna doba pomeni čas:

- od razpoka jajčnih ovojev do začetka popadkov
- odpiranje maternice pri prvorodnici
- od začetka rednih popadkov do popolnoma odprtega materničnega ustja
- star izraz, ki ga moderno porodništvo ne uporablja več
- vstopanje glavičice v porodni kanal in spuščanje

11. Hormonska zdravila se v ginekološki onkologiji uporabljajo pri:

- raku dojk
- raku zunanjega spolovila
- raku nožnice
- pri vseh rakih
- pri nobenem

12. Dopolnilno sistemsko zdravljenje:

- je zdravljenje s sistemskimi zdravili po kirurškem zdravljenju
- je zdravljenje s sistemskimi zdravili pred kirurškim zdravljenjem
- imenujemo tudi adjuvantno zdravljenje
- imenujemo tudi neoadjuvantno zdravljenje
- je zdravljenje metastatske oblike maligne bolezni

13. Po definiciji placenta previa pomeni:

- prezgodnja ločitev sicer normalno ležeče posteljice
- predležeča posteljica
- prezgodaj ugnježena posteljica
- lega posteljice, ki onemogoča normalni vaginalni porod
- krvaveča posteljica

14. Neplodnost je nezmožnost zanositve po:

- 1 letu rednih spolnih odnosov
- 2 letih rednih spolnih odnosov
- 3 letih rednih spolnih odnosov
- 4 letih rednih spolnih odnosov
- nobeno od naštetega

15. Tubarna neplodnost, je najpogosteje posledica:

- pelvičnega vnetja
- razvojnih nepravilnosti
- hormonskih nepravilnosti
- mimov
- kirurškega posega

16. Laparoskopija je preiskava s katero ugotavljamo:

- zarastline v mali medenici
- prehodnost jajcevodov
- obliko maternične votline
- ovulatornost ciklusov
- prisotnost endometrioze na pelvičnem peritoneju

17. Neplodnost je lahko posledica:

- agenezije maternice
- pelvičnega vnetja
- vnetja Bartolinijeve žleze
- motnje ovulacije
- dismenoreje

18. Najpogostejši klinični znaki zunajmaternične nosečnosti so:

- bolečina v spodnjem delu trebuha
- krvavitev iz nožnice
- dispneja
- melena
- izostanek perila

19. Preiskave za ugotavljanje vzrokov pelvične bolečine so:

- postkoitalni test

- laparoskopija
- kolposkopija
- amniocenteza
- ultrazvočni pregled

20. Znaki grozečega splava so:

- povišana telesna temperatura
- krvavitev iz nožnice
- slabost z bruhanjem
- pogosto uriniranje
- nič od naštetega

21. Disparevnija je:

- bolečina v področju diskusa
- bolečina pri mesečnem perilu
- izostanek mesečnega perila
- bolečina pri spolnem odnosu
- ovulacijska bolečina v sredini ciklusa

22. Adenomioza je:

- mejno maligna bolezen maternice
- izvengenitalna endometrioza
- endometrioza maternice
- polip endometrija
- endometrioza jajčnika

23. Limfa iz dojke odteka v:

- aksilarne bezgavke
- ingvinalne bezgavke
- parasternalne bezgavke
- supraklavikularne bezgavke
- iliakalne bezgavke

24. Diagnostične metode pri ugotavljanju tumorjev jajčnika:

- klinični pregled
- kolposkopija
- tumorski markerji
- ultrazvok
- gastroskopija

25. Metode zgodnjega odkrivanja raka materničnega vratu so:

- bris po PAPA

- cistoskopija
- kolposkopija
- Schillerjev test
- RTG male medenice

26.Zgodnji simptomi pri karcinomu materničnega vratu so:

- bolečine pri odnosih
- postkoitalna krvavitev
- mikcijske motnje
- obstipacija
- kaheksija

27.Pri karcinomu jajčnika Figo stadija 1 se tumor nahaja:

- v jetrih
- na enem ali obeh jajčnikih
- v vranici
- na jajcevodu
- v bezgavkah

28.Kadar govorimo o vnetju zgornjega dela genitalnega trakta mislimo na

vnetje:

- materničnega telesa
- vulve
- vagine
- jajcevodov in jajčnikov
- vratu maternice

29.Katere slikovne diagnostične metode uporabljamo v ginekološki

onkologiji:

- ultrazvočna preiskava rodil
- laboratorijsko določanje tumorskih markerjev
- rentgensko slikanje pljuč
- bris materničnega vratu
- magnetno-resonančno slikanje

30.Pri predležehi posteljici je lega posteljice:

- v fundusu
- na zadnji steni
- na sprednji steni
- čez zunanje maternično ustje
- čez notranje maternično ustje

31.Pri atoniji maternice je prvi ukrep:

- iztipanje maternice

- led na trebuh
- kiretaža maternice
- bimanualna masaža maternice
- aplikacija prostaglandinov intrauterino

32. Do oploditve jajčne celice običajno pride:

- v nožnici
- v maternici
- v jajcevodu
- v jajčniku
- v Bartolinijevi žlezi

33. Pri postopkih zunajtelesne oploditve prenesemo jajčece v:

- nožnico
- maternični vrat
- maternično votlino
- jajcevod
- jajčnik

34. Zunajmaternična nosečnost je življenjsko ogrožujoča zaradi:

- hormonskih motenj
- prekomernega bruhanja
- krvavitve
- kancerogenosti
- nič od naštetega

35. Z dismenorejo označujemo:

- bolečino ob spolnih odnosih
- bolečino pri ovulaciji
- moteno izločanje cervikalne sluzi
- šibko menstruacijo
- bolečino ob menstruaciji

36. Prezgodnji porod je porod, ki se zgodi:

- po pričakovanem datumu poroda
- pred 20 tednom nosečnosti
- od 24 do 34 tedna nosečnosti
- od 24. tedna do 37. tedna nosečnosti
- od 20. do 37 tedna nosečnosti

37. Pri sindromu Rokitansky-Mayer-Kuster-Hauser gre za:

- moški genotip
- aplazijo ali hipoplazijo maternice-
- aplazijo ali hipoplazijo jajcevodov in jajčnikov
- sekundarno amenorejo
- neplodnost

38. Benigni tumorji dojke so:

- fibroadenom
- intraduktalni papilom
- lipom
- duktalni karcinom
- lobularni karcinom

39. Rak dojke je:

- redka bolezen
- najpogostejše maligno obolenje žensk
- najbolj razširjen v nerazvitih delih sveta
- v Sloveniji je incidenca okoli 50/100.000
- v Sloveniji je incidenca okoli 100/100.000

40. VAIN so intraepitelne neoplazme:

- vratu maternice
- vulve
- vagine
- vezivnega tkiva
- dojke

41. Značilnosti benignih tumorjev so:

- so dobro omejeni
- so slabo omejeni
- rastejo ekspanzivno
- rastejo infiltrativno
- zasevajo v oddaljene organe

42. Značilnosti malignih tumorjev so:

- so dobro omejeni
- so slabo omejeni
- rastejo ekspanzivno
- rastejo infiltrativno
- zasevajo v oddaljene organe

43. Trening mehurja:

- drugo ime za ta trening so Keglove vaje
- pri treningu stiskamo mišice medeničnega dna
- odvajanje vode na čim daljše časovne intervale (na 2 do 3 ure)

- premagovanje oz. obvladovanje tiščanja na vodo
- nič od naštetega

44. Kakšen je ukrep pri ugotovljeni abrupciji posteljice ob terminu v

primeru, da je plod živ:

- počakati, da krvavitev preneha
- takojšni vaginalni pregled, da se ugotovi odprtost ustja
- pospešitev poroda z zdravili
- takojšni carski rez
- nič od naštetega

45. Z določanjem katerega hormona ugotavljamo delovanje rumenega

telesca:

- FSH
- estradiola
- progesterona
- PRL
- LH

46. Zunajmaternično nosečnost zdravimo:

- z obsevanjem
- punkcijo
- dehidracijo
- operativno odstranitvijo
- s sistemsko aplikacijo metotreksata

47. Akutna pelvična bolečina je lahko znak:

- pelvičnega vnetja
- displazije na materničnem vratu
- izostanka ovulacije
- torzije adneksov
- zunajmaternične nosečnosti

48. Limfadenektomija je sestavni del operacije pri zdravljenju:

- karcinoma dojke
- karcinoma jajčnika
- karcinoma vratu maternice
- karcinoma vulve
- karcinoma endometrija



49. Konizacija je:

- metoda zdravljenja napredovalega raka materničnega vratu
- klinasta resekcija jajčnika
- biopsija materničnega vratu s kleščami po Faure-ju
- odstranitev dela materničnega vratu v obliki stožca**
- metoda zaustavljanja krvavitve iz vratu maternice po biopsiji

50. Oksitocin:

- je hormon**
- izločajo ga jajčniki
- izloča ga zadnji režnj hipofize**
- pomemben je v menstrualnem ciklusu
- je pomemben pri dojenju**