Matematika 1
5. januar 2010

Uporaba določenega integrala v geometriji

- Ploščina krivočrtnega lika

Naj bo $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ pozitivna integrabilna funkcija. Potem je po definiciji določenega integrala

$$\int_a^b f(x)dx$$

ravno ploščina med abscisno osjo in grafom funkcije f na intervalu $[a, b]$.



Če integrabilna funkcija $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ na intervalu $[a, b]$ ni povsod pozitivna, potem interval $[a, b]$ razdelimo na taki podmnožici, da je na eni podmnožici funkcija nenegativna in na drugi negativna.
Ploščina med abscisno osjo in grafom funkcije f je potem vsota integrala funkcije f na prvi podmnožici in integrala funkcije f na drugi podmnožici pomnoženega z -1.



Naj bosta $g, f : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrabilni funkciji in naj bo $f(x) \geq g(x)$ za vsak $x \in [a, b]$. Potem je ploščina območja med grafoma funkcij f in g na intervalu $[a, b]$ enaka

$$\int_a^b (f(x) - g(x))dx.$$



Če $f(x)$ ni več od $g(x)$ za vsak x, potem, podobno kot prej, razdelimo interval $[a, b]$ na dve podmnožici in nato na podmnožici, kjer je $f(x) < g(x)$, integral pomnožimo z -1.



- Ploščina izseka do krivulje v polarni obliki

Naj bo $r = r(\varphi)$ sklenjena krivulja, podana v polarni obliki za $\varphi \in [\alpha, \beta]$.



Zanima nas ploščina območja, omejenega s krivuljo $r = r(\varphi)$ in poltrakoma $\varphi = \alpha$ ter $\varphi = \beta$.
Kot od kota α do kota β razdelimo na n manjših kotov od φ_{k-1} do φ_k, pri čemer je $\varphi_0 = \alpha$ in $\varphi_n = \beta$.
Če so koti $\varphi_k - \varphi_{k-1}$ dovolj majhni, potem je $r(\varphi_{k-1}) \doteq r(\varphi_k)$ in ploščina izseka do krivulje $r = r(\varphi)$ je približno enaka ploščini krožnega izseka s polmerom $r(\varphi_k)$ in kotom $\varphi_k - \varphi_{k-1}$, torej

$$\frac{1}{2}(r(\varphi_k))^2(\varphi_k - \varphi_{k-1}).$$

Definiramo integralsko vsoto

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2}(r(\varphi_k))^2(\varphi_k - \varphi_{k-1})$$

in pogledamo, koliko je limita integralskih vsot, ko gre $n \to \infty$ in $\varphi_k - \varphi_{k-1} \to 0$ za vsak k.
Če limita obstaja, potem je ploščina enaka

$$S = \frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta} (r(\varphi))^2 d\varphi.$$

Primer

Izračunajmo ploščino območja, omejenega s krivuljo $r(\varphi) = \sin(2\varphi)$.



Opomba

Ker je $x = r\cos\varphi$ in $y = r\sin\varphi$, je
$dx = dr\cos\varphi - r\sin\varphi d\varphi$ in
$dy = dr\sin\varphi + r\cos\varphi d\varphi$.
Izračunamo $xdy - ydx$ in dobimo, da je

$$\frac{1}{2}(xdy - ydx) = \frac{1}{2}r^2 d\varphi.$$

Izraz $\frac{1}{2}(xdy - ydx)$ imenujemo diferencial ploščine in je enak ploščini krivočrtnega trikotnika s koordinatami $(0,0)$, (x,y) in $(x+dx, y+dy)$.

- Ločna dolžina krivulje

Naj bo krivulja podana z zvezno odvedljivo funkcijo $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$.



Zanima nas dolžina krivulje od točke $(a, f(a))$ do točke $(b, f(b))$.
Na krivulji si izberemo točke $T_k(x_k, f(x_k))$, $k = 0, \ldots, n$, pri čemer je $x_0 = a$ in $x_n = b$.
Točke povežemo z daljicami in dobimo poligonsko črto, katere dolžina je po Pitagorovem izreku enaka

$$\sum_{k=1}^{n} \sqrt{(x_k - x_{k-1})^2 + (f(x_k) - f(x_{k-1}))^2}.$$

Ta dolžina je tem boljši približek dolžine krivulje, čim krajše so razdalje med točkami T_{k-1} in T_k.

Razliko $f(x_k) - f(x_{k-1})$ s pomočjo Lagrangeovega izreka zapišemo na naslednji način

$$f(x_k) - f(x_{k-1}) = f'(\xi_k)(x_k - x_{k-1}),$$

kjer je $\xi_k \in (x_{k-1}, x_k)$.

Sledi, da je

$$\sum_{k=1}^{n} \sqrt{(x_k - x_{k-1})^2 + (f(x_k) - f(x_{k-1}))^2}$$
$$= \sum_{k=1}^{n} \sqrt{(x_k - x_{k-1})^2 + (f'(\xi_k)(x_k - x_{k-1}))^2}$$
$$= \sum_{k=1}^{n} \sqrt{1 + (f'(\xi_k))^2}\,(x_k - x_{k-1})$$

Definiramo integralsko vsoto

$$\sum_{k=1}^{n} \sqrt{1+(f'(\xi_k))^2}\,(x_k - x_{k-1})$$

in pogledamo, koliko je limita integralskih vsot, ko gre $n \to \infty$ in $x_k - x_{k-1} \to 0$ za vsak k.
Če limita obstaja, potem je dolžina krivulje enaka

$$s = \int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}dx.$$

Zapišimo $s = \int_a^x \sqrt{1+(y'(x))^2}dx.$
Potem je $ds = \sqrt{1+(y'(x))^2}dx.$
Zapišemo lahko $y' = \frac{dy}{dx}$, torej

$$ds^2 = dx^2 + dy^2.$$

Če je krivulja podana v parametrični obliki, torej $x = x(t)$ in $y = y(t)$, potem je

$$\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2,$$

oziroma

$$\dot{s}^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2.$$

Ker je

$$ds = \dot{s}dt = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}dt,$$

je dolžina parametrično podane krivulje enaka

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}dt.$$

Če pa je krivulja podana v polarni obliki $r = r(\varphi)$, potem je $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$ in

$$\frac{dx}{d\varphi} = r'\cos\varphi - r\sin\varphi, \quad \frac{dy}{d\varphi} = r'\sin\varphi + r\cos\varphi.$$

Sledi

$$\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}dt = \sqrt{(x')^2 + (y')^2}d\varphi = \sqrt{r^2 + (r')^2}d\varphi,$$

torej

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + (r')^2}d\varphi.$$

Primer

$\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\log x,\ x_1 = 1,\ x_2 = e.\ \ (s = \frac{e^2+1}{4}).$



Primer

$x = a(t - \sin t), y = a(1 - cost),\ t_1 = 0,\ t_2 = 2\pi.$
$(s = 8a).$