

## 2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

Univerzitetni študij

7. januar 2008

1. [15T] Določite ničle, pole, začetno vrednost, asimptoto in ekstreme ter čim bolj natančno narišite graf funkcije

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x + 4}.$$

**Rešitev:**

To je racionalna funkcija.

Ničle so rešitve enačbe  $x^2 + x - 6 = 0$ , torej  $x_1 = -3$ ,  $x_2 = 2$ .

Pol je rešitev enačbe  $x + 4 = 0$ , torej  $x = -4$ .

Začetna vrednost:  $f(0) = -\frac{3}{2}$ .

Asimptota je poševna, saj je stopnja števca za ena večja od stopnje imenovalca. Dobimo jo tako da delimo polinoma in dobimo:  $y = x - 3$ .

Ekstremi - izračunamo odvod:

$$f'(x) = \frac{(2x+1)(x+4) - (x^2 + x - 6)}{(x+4)^2} = \frac{x^2 + 8x + 10}{(x+4)^2}.$$

Odvod je enak 0, ko je  $x^2 + 8x + 10 = 0$ , torej so stacionarne točke  $x_1 = -4 - \sqrt{6}$  in  $x_2 = -4 + \sqrt{6}$ . Ker je  $f'(-7) > 0$  in  $f'(-6) < 0$ , je v točki  $-4 - \sqrt{6}$  lokalni maksimum in podobno ker je  $f'(-2) < 0$  in  $f'(-1) > 0$ , je v točki  $-4 + \sqrt{6}$  lokalni minimum.

2. [10T] Določite enačbo tangente in normale na graf funkcije


$$f(x) = e^{2x} \cos 3x$$

v točki  $x_0 = 0$ .

**Rešitev:**

Izračunamo odvod funkcije:

$$f'(x) = 2e^{2x} \cos 3x - 3e^{2x} \sin 3x.$$



Slika 1: Graf funkcije  $f(x) = \frac{x^2+x-6}{x+4}$ .

Smerni koeficient tangente je enak vrednosti odvoda v točki  $x_0$ :  $k_t = f'(0) = 2$ .

Smerni koeficient normale:  $k_n = -\frac{1}{k_t} = -\frac{1}{2}$ .

Izračunamo še  $y_0 = f(x_0) = 1$ .

Enačbo tangente dobimo po formuli  $y - y_0 = k_t(x - x_0)$ , torej  $y = 2x + 1$ , enačbo normale pa po formuli  $y - y_0 = k_n(x - x_0)$ , torej  $y = -\frac{1}{2}x + 1$ .

3. [15T] Izračunajte integral

$$\int \frac{3x^2 + 5x + 6}{(x+2)(x^2+x+2)} dx.$$

**Rešitev:**

To je integral racionalne funkcije, ki ga izračunamo s pomočjo nastavka:

$$\int \frac{3x^2 + 5x + 6}{(x+2)(x^2+x+2)} dx = A \ln|x+2| + B \ln|x^2+x+2| + C \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{7}} + D.$$

Nastavek odvajamo in dobimo:

$$\begin{aligned}
 \frac{3x^2 + 5x + 6}{(x+2)(x^2+x+2)} &= \frac{A}{x+2} + \frac{B(2x+1)}{x^2+x+2} + \frac{\frac{2C}{\sqrt{7}}}{1 + \frac{(2x+1)^2}{7}} \\
 &= \frac{A}{x+2} + \frac{2Bx+B}{x^2+x+2} + \frac{\frac{C\sqrt{7}}{2}}{x^2+x+2} \\
 &= \frac{(A+2B)x^2 + (A+5B+\frac{C\sqrt{7}}{2})x + 2A+2B+C\sqrt{7}}{(x+2)(x^2+x+2)}
 \end{aligned}$$

Dobimo sistem enačb:

$$\begin{aligned}
 A + 2B &= 3, \\
 A + 5B + \frac{C\sqrt{7}}{2} &= 5, \\
 2A + 2B + C\sqrt{7} &= 6,
 \end{aligned}$$

ki ima rešitev  $A = 2$ ,  $B = \frac{1}{2}$  in  $C = \frac{1}{\sqrt{7}}$ . Integral je torej:

$$\int \frac{3x^2 + 5x + 6}{(x+2)(x^2+x+2)} dx = 2 \ln|x+2| + \frac{1}{2} \ln|x^2+x+2| + \frac{1}{\sqrt{7}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{7}} + D.$$

4. [10T] Izračunajte dolžino loka krivulje

$$y = \sqrt{2x^3}$$

na intervalu  $0 < x < \frac{2}{3}$ .

**Rešitev:**

Ločno dolžino izračunamo po formuli  $s = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$ .

Ker je  $y' = \frac{3x^2}{\sqrt{2x^3}}$  in  $\sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{\frac{9x+2}{2}}$ , sledi:

$$s = \int_0^{\frac{2}{3}} \sqrt{\frac{9x+2}{2}} dx = \frac{2}{9} \int_1^4 t^{\frac{1}{2}} dt = \frac{4}{27} t^{\frac{3}{2}} \Big|_1^4 = \frac{28}{27}.$$

Napravili smo substitucijo:  $t = \frac{9x+2}{2}$ ,  $dt = \frac{9}{2}dx$ . Ko je  $x = 0$ , je  $t = 1$  in ko je  $x = \frac{2}{3}$ , je  $t = 4$ .