


KOZMETIČNI IZDELKI I

**KOŽA IN SLUZNICE – MESTO
DELOVANJA KOZMETIČNIH
IZDELKOV**


prof. dr. Julijana Kristl
10. 10. 2012



Kaj že veste o koži ?

Z gledišča

- anatomije
- morfologije
- fiziologije
- biokemije




Zgradba kože

- Epidermis - povrhnjica
- Dermis - usnjica
- Subcutis - podkožje
- Kožne žleze
- Lasje
- Nohti




Shematski prikaz zgradbe kože

1-povrhnjica, 2-usnjica,
3-podkožje, 4-ekrina znojnica,
5-apokrina znojnica, 6-las,
7-lojnika.

Usnjica je prepletena s
številnimi žilami-8 in
živci-9.




EPIDERMIS




Zgradba povrhnjice – gube in papile

Celična zgradba povrhnjice




a- Vrhnica pod
svetlobnim mikroskopom




a

b- Shematska predstavitev
mikroskopskega posnetka








b

Keratinociti v različnih plasteh povrhnjice



Mikroskopske slike povrhnjice



* različna barvanja

Plasti epidermisa

Intercellularne lamele

Keratinsko polnilo

Lamelarna telesa

Keratohialin

Keratinsko polnilo









Desmosomi


Hemidesmosomi



Epidermalna keratinizacija = programirana celična smrt?




Oznaka celice	Značilnost celice	Sestava	faze diferenciranja
rožene celice 4-6 plasti → rožena plast	1 brez jader in organel 2. s keratinom napolnjene celice (K) 3. debela membrana 4. desmosomi 5. lipidne intercelularne plasti 6. interfibrilarni cement 7. naravni vlažilni faktorji	   	K III faza luščenja
celice z zrnici 3-4 plasti → zrnata plast	1 keratinolinska zrnca (KHG) 2. Odlanova telesca (OK) 3. zlepljene tonofibrili	  	KHG OK II prehodna faza
5-6 plasti → trnasta plast	1 citoplazmotski nastavki 2. tonofibrili (TF) 3. melanosomi		TF I faza sinteze proteinov in lipidov
bazalne celice 1 plast	1 se lahko delijo 2. Tonofilamenti (Tf) 3. citoplazemski nastavki z desmosomi 4. melanosomi	  	Tf




Kaj so melanociti?

- porazdelitev
- zgradba
- vloga


Kje vse najdemo melanocite v koži?




Lokalisationen




1. In der Epidermis
zwischen den
Keimzellen




Verteilung in der Haut



2. Im Haar-
Talg-Follikel




3. Im Auge



Anzahl. Die Farbe der Haut spielt keine Rolle.

Različne stopnje melanogeneze




Odločilni dejavniki za barvo kože

Tabelle 2-1: Die Bestimmungsparameter für die Farbe der Haut

		Hellhäutige Menschen		Dunkelhäutige Menschen
Melano-somen	Größe	Klein		
	Verteilung	Bis zur dritten Lage der Stachelzellschicht		
	Produktion	Stimulation durch UV-Strahlen erforderlich		
Qualität des Melanins		Phäomelanin+++		Eumelanin +++


The diagram illustrates the epidermal layers and melanocyte distribution. The epidermis is shown with five distinct layers from top to bottom: Hornschicht (stratum corneum), Körnerzellschicht (stratum granulosum), Stachelzellschicht (stratum spinosum), Basalzellschicht (stratum germinativum), and Melanocyte. Melanocytes are specialized cells that produce melanin. In light-skinned individuals (left), melanocytes are small and located in the basal layer, producing phaeomelanin (represented by yellow dots). In dark-skinned individuals (right), melanocytes are larger and produce eumelanin (represented by black dots), and they extend deeper into the epidermis, covering multiple layers.



Kaj so Langerhansove celice?

- porazdelitev
- število
- pomen v koži



Imunska kompetentnost Langerhansovih celic v koži



DERMIS -USNJICA



celice




izvencelično
ogrodnje

osnovna
substanca


kolagenska
vlakna


elastična
vlakna

Fibroblasti in njihove številne aktivnosti



Količina vode v koži







Ali so v koži čutne celice?


- porazdelitev
- zgradba
- vloga

Oživčenje kože



Živčna telesca kože






Podatki o receptorjih v koži


Receptor	Osjet	Približan broj/cm ²
Slobodni okrajci živaca	bol	200
Merkelove pločice	dodir	3000
Meissnerova tjelešca	pritisak	25
Krauseova tjelešca	hladnoća	12
Ruffinijeva tjelešca	toplina	2
Vater-Pacinijeva lamelarna tjelešca	pritisak i duboki senzibilitet	2
Golgi-Mazzonijeva tjelešca	pritisak	

Struktura kože PODKOŽJE




- | | |
|---|---|
| 1 - Epidermis | 9 - Fettlappen |
| 2 - Hornschicht | 10 - Fettläppchen |
| 3 - Dermis | 11 - Adipozyten |
| 4 - Papillarschicht der Dermis | 12 - In den Scheidewänden zwischen den Lappen und Läppchen ist eine starke arterielle, venöse und lymphatische Vaskularisation vorhanden. |
| 5 - Retikularschicht der Dermis | |
| 6 - Subcutis | |
| 7 - Kollagenfaserbündel | |
| 8 - Kollagenfasern, die Lappen und Läppchen begrenzen | 13 - Durch die Scheidewände verlaufen die sensorischen Nerven. |

Žilni sistem kože




Shematski prikaz oskrbe kože s krvjo



Katere funkcije ima koža?

- 1 – zaščitna funkcija,
- 2 - izmenjevalna,
- 3 - termoregulacija,
- 4 - senzorične funkcije,
- 5 - metabolične funkcije



Pomen različnih struktur kože pri zaščiti


Einflüsse

Hornschicht


Epidermis

Dermis


Subcutis




Koža kot bariera med notranjostjo telesa in okolico




Sonce, vitamin D in kalcij






USTNA SLUZNICA




USM MASTERS



Morfološka slika ustne sluznice

Medscape®

www.medscape.com



Oral mucosa is a specialized type of tissue which lines the mouth. This tissue is designed to provide protection for the body from infection and debris, and it is capable of producing secretions such as mucus in addition to absorbing materials introduced into the mouth. The trait of absorption is utilized to apply certain types of medications, such as oral vaccines, in which the medication is absorbed directly through the oral mucosa.

Three different types of oral mucosa can be found in the mouth. Around the tongue, cheeks, and hard palate, the tissue is keratinized so that it can withstand the abrasiveness of chewing. Other areas of the mouth have non-keratinized tissue, which is more fragile, and requires moist secretions to stay healthy. The taste buds are made from a third type of highly specialized oral mucosa. Similar types of mucus membranes can be found in other regions of the body, such as the eyes and genitals.

Slina

Suha usta

Prepustnost ustne sluznice

Razjede

....