

# Matematika 1

## Rešitve 12. sklopa nalog

---

### Taylorjeva vrsta

(5) Določi območje konvergencije danih potenčnih vrst, nato pa še izračunaj njuni vsoti:

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n},$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{(n+1)!}.$$

*Rešitev:* Pri izračunu vsote potenčne vrste lahko uporabimo izrek, ki pravi, da lahko potenčne vrste členoma odvajamo in integriramo:

Naj bo  $R$  konvergenčni polmer potenčne vrste  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$  in  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$  njena vsota na  $(a-R, a+R)$ . Potem za  $x \in (a-R, a+R)$  velja

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-a)^{n-1},$$

$$\int_a^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-a)^{n+1}.$$

(a) Potenčna vrsta  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n}$  ima središče v točki  $a = 1$  in koeficiente  $a_n = \frac{1}{n}$ . Konvergenčni polmer vrste je enak

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} = 1.$$

Vrsta torej konvergira na intervalu  $I = (0, 2)$ . Poglejmo še robni točki:

$$\cdot x = 0 \rightsquigarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} < \infty \Rightarrow \text{vrsta konvergira pri } x = 0,$$

$$\cdot x = 2 \rightsquigarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty \Rightarrow \text{vrsta divergira pri } x = 2.$$

Od tod sledi, da vsota vrste določa zvezno funkcijo na intervalu  $[0, 2]$ , ki je analitična v njegovi notranjosti.

Definirajmo sedaj funkcijo  $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$  s predpisom

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n}.$$

Z odvajanjem zgornje vrste dobimo

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (x-1)^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (x-1)^n = \frac{1}{1-(x-1)} = \frac{1}{2-x}.$$


Pri tem smo uporabili formulo za vsoto geometrijske vrste. Z integriranjem sedaj dobimo

$$f(x) = -\ln(2-x) + C.$$

Vrednost konstante  $C$  lahko dobimo z izračunom funkcije  $f$  v kakšni točki. Najlažje je vzeti kar središče potenčne vrste. Pri  $x = 1$  tako dobimo  $f(1) = 0 = C$ , od koder sledi

$$f(x) = -\ln(2-x).$$

Na levi sliki so narisani grafi vsote vrste, njene razširitve in pa aproksimacij vsote vrste s končnimi vsotami za  $k \in \{1, 2, 5, 10\}$ .



Zanimivo je pogledati, kaj se zgodi s končnimi aproksimacijami, če pogledamo vrednosti, ki so malce manjše od nič. Na desni sliki so prikazane aproksimacije za  $k \in \{20, 50, 100, 500\}$ . Opazimo lahko, da na intervalu  $[0, 2]$  aproksimacije konvergirajo k funkciji  $f$ . Kakor hitro pa je  $x < 0$ , pa začne vsota vrste rasti čez vse meje.

(b) Konvergenčni polmer vrste  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{(n+1)!}$  je enak

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{(n+2)!}}{\frac{n+2}{(n+3)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+3)!}{(n+2)(n+2)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+3)}{n+2} = \infty,$$

kar pomeni, da vrsta konvergira za vsak  $x \in \mathbb{R}$ . Če definiramo funkcijo  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  kot vsoto potenčne vrste

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{(n+1)!},$$

je torej  $f$  cela funkcija. Če našo vrsto členoma integriramo, dobimo

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!} = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{1}{x} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \frac{1}{x} (e^x - x - 1).$$

Z uporabo osnovnega izreka analize sedaj sledi

$$f(x) = \left( \int_0^x f(t) dt \right)' = \frac{(e^x - 1)x - (e^x - x - 1)}{x^2} = \frac{e^x x - e^x + 1}{x^2}.$$

□

(6) Določi območje konvergencije in izračunaj vsoto potenčne vrste

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1},$$

nato pa še vsoto vrste

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots.$$

*Rešitev:* Naj bo

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

Iz formule

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2n+1]{\frac{1}{2n+1}} = 1$$

sklepamo, da je konvergenčni polmer vrste enak  $R = 1$ . Vrsta konvergira tudi pri  $x = \pm 1$ , od koder sledi, da je  $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  zvezna funkcija. Ker lahko potenčne vrste členoma odvajamo, je

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots = \frac{1}{1+x^2}.$$

Z integriranjem dobimo

$$f(x) = \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctg x + C.$$


Konstanto  $C$  določimo z izračunom v neki točki, ki je ponavadi kar središče potenčne vrste. Dobimo  $0 = f(0) = \arctg 0 + C$ , kar nam da  $C = 0$ . Posredno smo tako izračunali Taylorjevo vrsto funkcije  $\arctg$  v okolini točke  $x = 0$

$$\arctg x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots,$$

ki konvergira za  $|x| \leq 1$ . Če izberemo  $x = 1$ , pa dobimo

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \arctg 1 = \frac{\pi}{4}.$$

Poglejmo še graf funkcije  $\arctg$  in pa nekaj končnih aproksimacij s Taylorjevimi polinomi.



Opomba: Teorija potenčnih vrst nam med drugim pomaga izračunati tudi vsote nekaterih zanimivih številskih vrst. Glavno idejo lahko strnemo v naslednjih nekaj korakov:

- Poišči potenčno vrsto, katere izračun v neki točki sovpada z dano številsko vrsto.
- Izračunaj vsoto potenčne vrste v poljubni točki.
- Vstavi v izraz za vsoto potenčne vrste ustrezeno vrednost.

□

(7) Razvij dani funkciji v Taylorjevo vrsto okoli točke  $a = 0$ :

$$(a) \ f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x},$$

$$(b) \ f(x) = \frac{1}{2-3x+x^2}.$$

*Rešitev:* Naj bo  $f$  gladka funkcija na neki okolini  $(a - \delta, a + \delta)$  točke  $a$ . Taylorjeva vrsta funkcije  $f$  glede na točko  $a$  je potenčna vrsta

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(a) \frac{(x-a)^n}{n!} = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots$$

Če Taylorjeva vrsta konvergira k funkciji  $f$  na  $(a - \delta, a + \delta)$ , rečemo, da je  $f$  *analitična* funkcija na  $(a - \delta, a + \delta)$ . Omeniti velja, da se lahko zgodi, da Taylorjeva vrsta dane funkcije konvergira k neki drugi funkciji. Osnovni primeri Taylorjevih vrst so:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, \quad |x| < 1,$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}x^2 + \binom{\alpha}{3}x^3 + \dots, \quad |x| < 1, \alpha \in \mathbb{R}.$$

Za poljubno realno število  $\alpha$  je posplošeni binomski simbol definiran s predpisom

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

Pri  $\alpha = -1$  tako dobimo:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \dots \\ \frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + \dots \end{aligned}$$

(a) Za razvoj funkcije v Taylorjevo vrsto v okolini dane točke moramo izračunati vrednosti vseh odvodov funkcije v tej točki. V splošnem je računanje odvodov težko in zamudno,

včasih pa si lahko delo olajšamo, če znamo dano funkcijo zapisati kot produkt funkcij, katerih Taylorjeve vrste že poznamo. V našem primeru je:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\ln(1+x)}{1+x}, \\ &= \left( x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \right) (1 - x + x^2 - x^3 + \dots), \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n. \end{aligned}$$

Števila  $a_n$  dobimo s konvolucijskim produktom obeh vrst:

$$\begin{aligned} a_0 &= 0, \\ a_1 &= 1, \\ a_2 &= -\left(1 + \frac{1}{2}\right), \\ a_3 &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

za splošni člen pa velja

$$a_n = (-1)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}\right).$$

Torej je

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}\right) x^n = x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{6}x^3 + \dots$$

(b) V tem primeru je:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2-3x+x^2} = \frac{1}{(2-x)(1-x)} = \frac{1}{2} \frac{1}{(1-\frac{x}{2})(1-x)}, \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{8} + \dots\right) (1 + x + x^2 + x^3 + \dots), \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n. \end{aligned}$$

Števila  $a_n$  dobimo s konvolucijskim produktom obeh vrst:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2}, \\ a_1 &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2}\right), \\ a_2 &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right), \\ a_3 &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right), \end{aligned}$$

za splošni člen pa velja

$$a_n = \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n} \right) = \frac{1}{2} \frac{1 - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^{n+1}}.$$

Taylorjeva vrsta funkcije  $f$  glede na točko  $x = 0$  je torej

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left( 1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right) x^n = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}x + \frac{7}{8}x^2 + \frac{15}{16}x^3 + \cdots$$

□

(8) Razvij funkcijo

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

v Taylorjevo vrsto okoli točke  $a = 0$ .

*Rešitev:* V verjetnosti, statistiki, fiziki, računalništvu in drugod je pomembna standardna normalna porazdelitev z verjetnostno gostoto

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Je ena izmed funkcij, katere nedoločeni integral ni elementarna funkcija. Njen nedoločeni integral ponavadi označimo s  $\Phi$ , omogoča pa nam, da računamo verjetnosti, da normalno porazdeljena slučajna spremenljivka zavzame vrednosti na določenem intervalu.

Funkcijo  $\Phi$  lahko razvijemo v Taylorjevo vrsto, ki konvergira na celi realni osi. Pri tem bomo uporabili dejstvo, da lahko potenčne vrste členoma integriramo. Uporabili bomo formulo

$$e^{-\frac{t^2}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{2^n n!},$$


od koder sledi

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n}}{2^n n!} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n+1}}{(2n+1)2^n n!}.$$

Če izračunamo prvih nekaj členov, dobimo

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left( x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{40} - \frac{x^7}{336} + \cdots \right).$$

Funkcija  $\Phi$  je omejena in ima vodoravni asymptoti  $y = \pm 0.5$ .



□

## Funkcije večih spremenljivk

(1) Skiciraj naravni definicijski območji, nivojnice in grafa danih funkcij:

$$(a) \ f(x, y) = \arcsin \frac{y}{x},$$

$$(b) \ f(x, y) = \sqrt{\sin(\pi\sqrt{x^2 + y^2})}.$$


*Rešitev:* (a) Funkcija  $f(x, y) = \arcsin \frac{y}{x}$  bo definirana, če bo:

- $x \neq 0,$
- $-1 \leq \frac{y}{x} \leq 1.$

Iz drugega pogoja dobimo, da za  $x > 0$  velja  $-x \leq y \leq x$ , za  $x < 0$  pa  $-x \geq y \geq x$ . Sledi

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x > 0 \wedge -x \leq y \leq x) \vee (x < 0 \wedge x \leq y \leq -x)\}.$$

Definicijsko območje funkcije  $f$  sestoji iz dveh kvadrantov, ki sta zarotirana za kot  $\frac{\pi}{4}$  glede na standardne koordinatne kvadrante.



Nivojnice funkcije  $f$  so množice oblike


$$f(x, y) = C,$$

pri različnih izbirah konstante  $C$ . Nivojnice funkcije dveh spremenljivk večinoma sestojijo iz krivulj, lahko pa vsebujejo tudi kakšno izolirano točko.


V našem primeru so nivojnice krivulje, ki zadoščajo enačbi

$$\begin{aligned} \arcsin \frac{y}{x} &= C, \\ \frac{y}{x} &= \sin C, \\ y &= (\sin C)x. \end{aligned}$$

Možne vrednosti konstante  $C$  ležijo na intervalu  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ . Za vsak tak  $C$  je ustrezna nivojnica premica s smernim koeficientom  $\sin C$ , vendar brez točke  $(0, 0)$ .




Graf funkcije  $f$  skiciramo tako, da vsako izmed teh premic dvignemo na ustrezeno višino.




(b) Funkcija  $f(x, y) = \sqrt{\sin(\pi\sqrt{x^2 + y^2})}$  bo definirana, če bo  $\sin(\pi\sqrt{x^2 + y^2}) \geq 0$ . To bo res za

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \in [0, 1] \cup [2, 3] \cup [4, 5] \cup \dots = \bigcup_{k=0}^{\infty} [2k, 2k+1].$$

Definicijsko območje je torej unija kolobarjev z notranjim polmerom  $r_k = 2k$  in z zunanjim polmerom  $R_k = 2k+1$  za  $k \geq 1$ . Pri  $k = 0$  dobimo krog s polmerom  $R = 1$ .




Nivojnica so krožnice s središči v točki  $(0, 0)$  in s polmeri  $R$ , za katere je  $\sin(\pi R) \geq 0$ .



V tem primeru je graf funkcije  $f$  rotacijska ploskev, ki jo lahko narišemo takole:

- Nad abscisno osjo narišemo graf funkcije  $x \mapsto \sqrt{\sin \pi x}$ .
- Graf zavrtimo okoli navpične osi.

Poglejmo si še skico.



□