

## Poglavje IV

# Determinanta matrike

V tem poglavju bomo vpeljali pojem determinante matrike, spoznali bomo njene lastnosti in nekaj metod za računanje determinant.

### 1 Definicija

Preden definiramo determinanto, se spomnimo, kaj je permutacija. Permutacija je bijektivna preslikava  $\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ . Množico vseh permutacij  $n$  elementov označimo s  $\Pi_n$ . Signaturo permutacije  $\sigma$  označimo s  $\text{sgn } \sigma$ . Definicija signature in osnovne lastnosti permutacij, ki jih bomo uporabljali pri obravnavi determinant, so opisane v dodatku A na koncu učbenika.

**Definicija 1.1** Naj bo

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

kvadratna matrika reda  $n$ . Potem je njena *determinanta* enaka

$$\det A = \sum_{\sigma \in \Pi_n} \text{sgn } \sigma a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)} .$$

Determinanta je tako preslikava  $\det : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ . Determinanto zapišemo tudi s tabelo

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} .$$

Za zgled izpišimo vsoto iz definicije za  $n = 2, 3$  in  $4$ .

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \\ = a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} + a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + \\ + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} + \\ + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} - \\ - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} - \\ - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} - \\ - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}$$

Ker je število permutacij množice  $\{1, 2, \dots, n\}$  enako  $n!$ , gotovo ne bo praktično računati determinanto s pomočjo definicije. O tem nas prepriča že zgled pri  $n = 4$ .

Preden začnemo s študijem lastnosti determinante, opozorimo na to, da smo determinanti za  $n = 2$  in  $n = 3$  že srečali v poglavju o vektorjih v  $\mathbb{R}^2$  in  $\mathbb{R}^3$ . Determinanta matrice  $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  je enaka mešanemu produktu vektorjev, ki tvorijo stolpce matrice  $A$ . Absolutna vrednost  $|\det A|$  je potem enaka volumnu paralelepipeda, ki ga določajo stolpci matrice  $A$ . Podobno je za  $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  absolutna vrednost  $|\det A|$  enaka ploščini paralelograma, ki ga določata stolpca matrice  $A$  v  $\mathbb{R}^2$ .

## 2 Razvoj determinante

*Minor* je poddeterminanta determinante

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

ki jo dobimo tako, da izpustimo enako število vrstic in stolpcev. Če v determinanti izpustimo  $i$ -to vrstico in  $j$ -ti stolpec, potem dobljeni minor označimo z  $m_{ij}$ . Kofaktor  $k_{ij}$  je predznačen minor:

$$k_{ij} = (-1)^{i+j} m_{ij} \quad \text{za } i, j = 1, 2, \dots, n.$$

**Zgled 2.1** V determinanti  $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}$  poiščimo nekaj minorjev in kofaktorjev:

$$m_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3, \quad m_{23} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -7, \quad m_{31} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1, \\ k_{11} = m_{11} = -3, \quad k_{23} = -m_{23} = 7, \quad k_{31} = m_{31} = 1. \quad \square$$

S pomočjo kofaktorjev lahko zapišemo rekurzivne formule za izračun determinante. Teh tu ne bomo dokazali.

**Izrek 2.2 (o razvoju determinante)** Za determinanto

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

velja:

- 1.)  $\det A = a_{i1}k_{i1} + a_{i2}k_{i2} + \dots + a_{in}k_{in}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , je razvoj determinante po  $i$ -ti vrstici.
- 2.)  $\det A = a_{1j}k_{1j} + a_{2j}k_{2j} + \dots + a_{nj}k_{nj}$ ,  $j = 1, 2, \dots, n$ , je razvoj determinante po  $j$ -tem stolpcu.

**Zgled 2.3** Izračunajmo  $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}$  z razvojem po prvem stolpcu:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 2(-3) - 0(-4) + 3 \cdot 1 = \\ = -3. \quad \square$$

Če je v kakem stolpcu ali vrstici veliko ničel, potem je izračun determinante hitrejši, če jo razvijemo po takem stolpcu ali vrstici.

**Zgled 2.4** Izračunajmo determinanto  $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 5 & -1 \end{vmatrix}$ . Z razvojem po tret-

jem stolpcu dobimo:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & -2 \\ 3 & -1 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -5 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix}.$$

Z razvojem zadnje determinante po drugem stolpcu dobimo:

$$-5 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = 10(2 + 2) = 40.$$

Iskana vrednost determinante je tako enaka 40. □

### 3 Lastnosti determinante

1.) Determinanti matrike in njene transponiranke sta enaki:

$$\det A = \det (A^T).$$

**Dokaz** Velja:

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{\sigma \in \Pi_n} \operatorname{sgn} \sigma a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)} = \\ &= \sum_{\sigma \in \Pi_n} \operatorname{sgn} \sigma a_{\sigma^{-1}(1)1} a_{\sigma^{-1}(2)2} \cdots a_{\sigma^{-1}(n)n} = \\ &= \det (A^T). \end{aligned}$$

V zgornjem računu smo uporabili dejstvo, da je  $\operatorname{sgn} \sigma = \operatorname{sgn} \sigma^{-1}$ . ■

2.) Če eno vrstico v matriki pomnožimo s skalarjem  $\alpha$ , se determinanta pomnoži z  $\alpha$ .

**Dokaz** Velja:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{i1} & \alpha a_{i2} & \dots & \alpha a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{\sigma \in \Pi_n} \operatorname{sgn} \sigma a_{1\sigma(1)} \cdots a_{i\sigma(i)} \cdots a_{n\sigma(n)} = \\ = \alpha \det A . \quad \blacksquare$$

- 3.) Če en stolpec v matriki pomnožimo s skalarjem  $\alpha$ , se determinanta pomnoži z  $\alpha$ .

**Dokaz** Ker je  $\det A = \det (A^\top)$  po 1.), lastnost 3.) sledi iz lastnosti 2.).  $\blacksquare$

- 4.) Če matriko pomnožimo s skalarjem, potem velja

$$\det(\alpha A) = \alpha^n \det A.$$

**Dokaz** Uporabimo lastnost 2.)  $n$ -krat.  $\blacksquare$

- 5.) Velja:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i1} + b_{i1} & a_{i2} + b_{i2} & \dots & a_{in} + b_{in} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \\ = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \dots & a_{i-1,n} \\ b_{i1} & b_{i2} & \dots & b_{in} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} .$$

**Dokaz** Z uporabo razvoja determinante po  $i$ -ti vrstici dobimo:

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i1} + b_{i1} & a_{i2} + b_{i2} & \dots & a_{in} + b_{in} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \\
 & = \sum_{j=1}^n (a_{ij} + b_{ij}) k_{ij} = \sum_{j=1}^n a_{ij} k_{ij} + \sum_{j=1}^n b_{ij} k_{ij} = \\
 & = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \dots & a_{i-1,n} \\ b_{i1} & b_{i2} & \dots & b_{in} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}. \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

- 6.) Če v matriki zamenjamo dve vrstici, se njena determinanta pomnoži z  $(-1)$ .

**Dokaz** Predpostavimo, da zamenjamo  $i$ -to in  $j$ -to vrstico, kjer je  $i < j$ . Če je  $\sigma \in \Pi_n$ , potem s  $\tilde{\sigma}$  označimo permutacijo, za katero je

$$\tilde{\sigma}(k) = \begin{cases} \sigma(k) , & \text{če } k \neq i, j \\ \sigma(i) , & \text{če } k = j \\ \sigma(j) , & \text{če } k = i \end{cases} .$$

Iz lastnosti permutacij vemo, da je  $\text{sgn } \tilde{\sigma} = -\text{sgn } \sigma$ . Z uporabo definicije

determinante dobimo

$$\begin{aligned}
 \det A &= \sum_{\sigma \in \Pi_n} \operatorname{sgn} \sigma a_{1\sigma(1)} \cdots a_{i\sigma(i)} \cdots a_{j\sigma(j)} \cdots a_{n\sigma(n)} = \\
 &= \sum_{\sigma \in \Pi_n} \operatorname{sgn} \sigma a_{1\sigma(1)} \cdots a_{j\sigma(j)} \cdots a_{i\sigma(i)} \cdots a_{n\sigma(n)} = \\
 &= \sum_{\sigma \in \Pi_n} \operatorname{sgn} \sigma a_{1\tilde{\sigma}(1)} \cdots a_{i\tilde{\sigma}(i)} \cdots a_{j\tilde{\sigma}(j)} \cdots a_{n\tilde{\sigma}(n)} = \\
 &= \sum_{\tilde{\sigma} \in \Pi_n} -\operatorname{sgn} \tilde{\sigma} a_{1\tilde{\sigma}(1)} \cdots a_{i\tilde{\sigma}(i)} \cdots a_{j\tilde{\sigma}(j)} \cdots a_{n\tilde{\sigma}(n)} = -\det \tilde{A} .
 \end{aligned}$$

Tu smo z  $\tilde{A}$  označili matriko, ki jo iz  $A$  dobimo tako, da zamenjamo  $i$ -to in  $j$ -to vrstico. ■

- 7.) Če sta dve vrstici v matriki  $A$  enaki, potem je njena determinanta enaka 0.

**Dokaz** Če v matriki enaki vrstici zamenjamo, se matrika ne spremeni. Iz lastnosti 6.) potem sledi, da je  $\det A = -\det A$ . Zato je  $\det A = 0$ . ■

- 8.) Če v matriki prištejemo skalarni večkratnik ene vrstice drugi vrstici, se determinanta ne spremeni.

**Dokaz** Z uporabo lastnosti 2.), 5.) in 7.) dobimo

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} + \alpha a_{i1} & a_{j2} + \alpha a_{i2} & \dots & a_{jn} + \alpha a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \\
 & = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{i1} & \alpha a_{i2} & \dots & \alpha a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \\
 & = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \alpha \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \\
 & = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} . \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$



9.) Velja

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1j} + b_{1j} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2,j-1} & a_{2j} + b_{2j} & a_{2,j+1} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{nj} + b_{nj} & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \\
 & = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1j} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2,j-1} & a_{2j} & a_{2,j+1} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{nj} & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \\
 & \quad + \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,j-1} & b_{1j} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2,j-1} & b_{2j} & a_{2,j+1} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,j-1} & b_{nj} & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.
 \end{aligned}$$

- 10.) Če v matriki zamenjamo dva stolpca, se njena determinanta pomnoži z  $(-1)$ .
- 11.) Če sta dva stolpca v matriki enaka, je njena determinanta enaka 0.
- 12.) Če v matriki prištejemo skalarni večkratnik enega stolpca drugemu stolpcu, se njena determinanta ne spremeni.

Lastnosti 9.), 10.), 11.) in 12.) sledijo iz lastnosti 5.), 6.), 7.) in 8.) z uporabo lastnosti 1.).

## 4 Računanje determinante

Če je  $D = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{bmatrix}$  diagonalna matrika, potem je njena determi-

nanta enaka produktu diagonalnih elementov:  $\det D = \prod_{i=1}^n d_i$ . To sledi iz definicije, saj za vsako neidentično permutacijo  $\sigma$  obstaja tak  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ , da je  $\sigma(i) \neq i$ .

Še več, za vsako neidentično permutacijo  $\sigma$  obstaja tak  $i$ , da je  $\sigma(i) < i$ . To dejstvo uporabimo za dokaz naslednje trditve:

**Trditev 4.1** Če je  $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$  zgornje-trikotna matrika, potem je  $\det A = \prod_{i=1}^n a_{ii}$ .

Ker je determinanto zgornje-trikotne matrike lahko izračunati, bomo to s pridom uporabili. Izkaže se, da lahko s pomočjo elementarnih transformacij na vrsticah tipa I in III kvadratno matriko  $A$  preoblikujemo v zgornje trikotno matriko  $T$ . Pri tem se pri transformaciji tipa I determinanta ne spremeni, pri transformaciji tipa III pa se determinanta pomnoži z  $(-1)$ .

Zato je  $\det A = (-1)^s \det T$ , kjer je  $s$  število transformacij tipa III, ki smo jih uporabili v postopku preoblikovanja  $A$  v  $T$ .

**Zgled 4.2** Izračunajmo determinanto matrike

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 4 & 4 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Najprej zamenjamo prvo in tretjo vrstico:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Prištejemo dvakratnik prve vrstice zadnji vrstici:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 4 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Prištejemo  $(-2)$ -kratnik tretje vrstice k zadnji vrstici:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 8 \end{bmatrix}.$$

Prištejemo z  $(-\frac{1}{2})$  pomnoženo drugo vrstico k tretji vrstici:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 8 \end{bmatrix}.$$

Zamenjamo zadnji dve vrstici:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & -3 & -\frac{5}{2} \end{bmatrix}.$$

Nazadnje prištejemo trikratnik tretje vrstice k zadnji vrstici in dobimo:

$$T = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{43}{2} \end{bmatrix}.$$

Ker smo uporabili dve transformaciji tipa III, je

$$\det A = \det T = -86 .$$

□

## 5 Determinanta produkta in prirejenka

Najprej si oglejmo pravilo, ki velja za determinanto produkta dveh matrik.

**Izrek 5.1** Če sta  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , potem je

$$\det AB = \det A \det B .$$

**Dokaz** Označimo  $C = AB$ . Naj bodo  $c_1, c_2, \dots, c_n$  stolpci matrike  $C$ ,  $a_1, a_2, \dots, a_n$  stolpci matrike  $A$  in

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{bmatrix}.$$

Potem je  $c_j = \sum_{i_j=1}^n b_{i_j j} a_{i_j}$ . Z uporabo lastnosti **9.**), **10.**), **11.**) in **1.**) za determinanto dobimo

$$\begin{aligned}
 \det C &= |c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n| = \\
 &= \left| \sum_{i_1=1}^n b_{i_1 1} a_{i_1} \ \sum_{i_2=1}^n b_{i_2 2} a_{i_2} \ \dots \ \sum_{i_n=1}^n b_{i_n n} a_{i_n} \right| = \\
 &= \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \dots \sum_{i_n=1}^n |b_{i_1 1} a_{i_1} \ b_{i_2 2} a_{i_2} \ \dots \ b_{i_n n} a_{i_n}| = \\
 &= \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \dots \sum_{i_n=1}^n b_{i_1 1} b_{i_2 2} \dots b_{i_n n} |a_{i_1} \ a_{i_2} \ \dots \ a_{i_n}| = \\
 &= \sum_{\sigma \in \Pi_n} b_{\sigma(1)1} b_{\sigma(2)2} \dots b_{\sigma(n)n} |a_{\sigma(1)} \ a_{\sigma(2)} \ \dots \ a_{\sigma(n)}| = \\
 &= \sum_{\sigma \in \Pi_n} \operatorname{sgn} \sigma b_{\sigma(1)1} b_{\sigma(2)2} \dots b_{\sigma(n)n} |a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n| = \\
 &= \det A \det (B^\top) = \det A \det B \ . \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

**Posledica 5.2** Če je  $A$  obrnljiva, potem je

$$\det (A^{-1}) = \frac{1}{\det A} \ .$$

**Dokaz** Ker velja  $AA^{-1} = I$  in  $\det I = 1$ , sledi iz prejšnjega izreka enakost

$$(\det A) (\det (A^{-1})) = 1 \ .$$

Torej je  $\det (A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$ . \blacksquare

Oglejmo si sedaj še definicijo in uporabo prirejenke.

**Definicija 5.3** Naj bo

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n} \ .$$

S  $k_{ij}$  označimo  $(i, j)$ -ti kofaktor  $\det A$ . Matriko

$$B_A = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_{n1} & k_{n2} & \dots & k_{nn} \end{bmatrix}^\top$$

imenujemo *prirejenka matrike*  $A$ .  $\diamond$

Naslednji izrek nam poda kriterij za obstoj inverza dane matrike. To je za nas najpomembnejši rezultat v poglavju o determinanti.

**Izrek 5.4** *Matrika*  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  *je obrnljiva natanko tedaj, ko je*  $\det A \neq 0$ . *Tedaj je*

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} B_A .$$

**Dokaz** Če je  $A$  obrnljiva, je  $(\det A) (\det (A^{-1})) = \det I = 1$ . Zato je  $\det A \neq 0$ .

Naj bo  $\det A \neq 0$ . Izračunajmo produkt  $AB_A$ :  $(i, j)$ -ti element matrike  $AB_A$  je enak  $\sum_{l=1}^n a_{il}k_{jl}$ . Po izreku o razvoju determinante je ta vsota enaka  $\det A$ , če je  $i = j$ . Če je  $i \neq j$ , potem je ta vsota razvoj determinante, ki ima  $i$ -to in  $j$ -to vrstico enako in je zato enaka 0. Tako dobimo

$$AB_A = \begin{bmatrix} \det A & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det A & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \det A \end{bmatrix} .$$

Ker je  $\det A \neq 0$ , je  $A \cdot \left(\frac{1}{\det A} B_A\right) = I$ . Zato je  $A^{-1} = \frac{1}{\det A} B_A$ .  $\blacksquare$

**Zgled 5.5** Če je  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  obrnljiva matrika v  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ , potem je

$\det A = ad - bc \neq 0$ . Njena prirejenka je  $B_A = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$  in njen inverz je

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} .$$

Konkretno, če je  $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ , potem je  $\det A = -1$  in  $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ .  $\square$

**Zgled 5.6** Poiščimo inverz matrike

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

s pomočjo prirejenke.

Izračunamo determinanto  $\det A = 7$  in prirejenko

$$B_A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -2 & 7 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 7 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Zato je  $A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 7 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ . □

**Posledica 5.7** *Produkt dveh obrnljivih matrik je obrnljiva matrika.*

**Dokaz** Če sta  $A$  in  $B$  obrnljivi matriki, potem je  $\det A \neq 0$  in  $\det B \neq 0$ . Zato je tudi  $\det AB = \det A \det B \neq 0$  in produkt  $AB$  je obrnljiva matrika. ■

## 6 Cramerjevo pravilo

Naj bo  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  obrnljiva matrika in naj bo  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  sistem linearnih enačb. Za  $j = 1, 2, \dots, n$  označimo z  $A_j(\mathbf{b})$  matriko, ki jo dobimo iz  $A$  tako, da  $j$ -ti stolpec zamenjamo z vektorjem  $\mathbf{b}$ .

**Izrek 6.1 (Cramerjevo pravilo)** *Če je  $A$  obrnljiva matrika v  $\mathbb{R}^{n \times n}$ , potem je rešitev sistema linearnih enačb  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  podana z*

$$x_j = \frac{\det A_j(\mathbf{b})}{\det A}, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

**Dokaz** Ker je  $A$  obrnljiva, iz zveze  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  sledi  $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \frac{1}{\det A}B_A\mathbf{b}$ . Naj

bo  $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ . Potem je  $j$ -ta komponenta produkta  $B_A\mathbf{b}$  enaka  $\sum_{i=1}^n k_{ij}b_i$ . Po

izreku o razvoju determinante je ta vsota enaka  $\det A_j(\mathbf{b})$ . Zato je

$$x_j = \frac{\det A_j(\mathbf{b})}{\det A} \quad \text{za } j = 1, 2, \dots, n. \quad \blacksquare$$

**Zgled 6.2** Rešimo sistem linearnih enačb

$$\begin{aligned} 3x - 2y &= 6 \\ -5x + 4y &= 8 \end{aligned}$$

s pomočjo Cramerjevega pravila. Velja:

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 4 \end{vmatrix} = 2.$$

Ker je  $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix}$ , je

$$\det A_1(\mathbf{b}) = \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ 8 & 4 \end{vmatrix} = 40 \quad \text{in}$$

$$\det A_2(\mathbf{b}) = \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ -5 & 8 \end{vmatrix} = 54.$$

Zato je rešitev enaka  $x = 20$  in  $y = 27$ . □

**Zgled 6.3** S pomočjo Cramerjevega pravila rešimo še sistem linearnih enačb

$$\begin{aligned} x - y + z &= 1 \\ -y + 2z &= 0 \\ x + 3z &= -1. \end{aligned}$$

Velja:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -3 - 2 + 1 = -4.$$

Vektor desne strani je  $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ , zato je

$$\det A_x(\mathbf{b}) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -3 + 2 - 1 = -2,$$

$$\det A_y(\mathbf{b}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 2 + 2 = 4 \quad \text{in}$$

$$\det A_z(\mathbf{b}) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 + 1 = 2.$$

Tako dobimo rešitev  $x = \frac{1}{2}$ ,  $y = -1$  in  $z = -\frac{1}{2}$ . □