

4. vaja: ARTROTOMIA KOLČNEGA SKLEPA

- artrotomija (mačke, psi)
- arthroskopsko (velike živali)

Indikacije:

- luksacija femorja
- fracture femorja (trochanter, vrat, epifiza)
- legg calve perthes (po infarktu vratu pride do nekroze glavice stegnenice)
- osteotomija (za živali do 15 kg)
- OCD (redko)
- corpora libera (tujki)
- artritis
- tumorji

PRAKTIČNO DELO

- dostopamo z lat. strani (med. manj običajno)
- perkutano tipamo trochanter major, krila os ischi in ilei
- Polkrožno prerežemo kožo in kožne mišice.
- Pridemo do **m. gluteus superficialis** (meja med njo in vastus lat. m. quadriceps). Razpremo in pridemo do **m. gluteus med.** (potek cran.-caud.); profundus v globini (pokrita z zgornjim m.).
- **M. rectus femoris** (pripenja se na ventralni rob os ilei) odmaknemo in pridemo do **m. articularis coxae** → na koncu dobimo trikotnik; v globini pod trochanterjem je sklepna kapsula → rez cca. 1 cm → vidimo del glavice femorja

Fiksacija luksiranega femorja (po Meju)

- zvežeš prox. del femorja z m. rectus femoris
- S Kirschnerjevo iglo (svedrom) zvrtno skozi glavico in vrat femorja proti os ilei. Nitko potegnemo skozi obe luknji in prišijemo na tetivni del mišice

Šivanje

- kapsula: enojni šiv; resorbivni 2/0 (mačke 4/0)
- podkožje: tekoči šiv; resorbivni 2/0 (mačke 4/0)
- koža: enojni šiv; neresorbivni 2/0, 3/0

Po operaciji

- obveza
- zaščitni ovratnik
- odstranitev šivov (10. dan)

Rezultat

- 14. dan
- 1 mesec (osteotomija)
- 1,5 meseca (fracture, loksacije)

Zugang zum kraniodorsalen Bereich des Hüftgelenks von kraniolateral (Fortsetzung)

