

# Ginekologija

1) Naštej v pravilnem vrstnem red (vstavi stevilo) :

- (4) vnezditev,
- (3) nastanek blastociste,
- (2) oploditev,
- (5) nastanek horionskih resic
- (1) ovulacija,

2) Ovarijsko odpoved dokazuje (obkroži en odgovor)

- a) znižana koncentracija FSH
- b) zvišana koncentracija FSH

3) Kongenitalna hiperplazija nadledvične žleze (AGS - adrenogenitalni talni sindrom) je primer (obkroži en odgovor)

1 ženskega psevdohermafroditizma

2 moškega psevdohermafroditizma

3 pravega hermefroditizma

5) Pubertetne spremembe pred 9. letom starosti najpogosteje povzročijo (obkroži en odgovor)

- 1) hipotireoza
- 2) nepravilna prehrana
- 3) prezgodnje zorenje hipotalamične hipofizne ovarijske osi

8. Pri testikularni feminizaciji - razvojni nepravilnosti z moški kariotipom (46,xy) najdemo: (obkroži en odgovor)

a) normalno žensko spolovilo normalno razvite dojke ter nerazvitost maternice in nožnice in primarno amenorejo

b) prekomerno poraščenost po moškem tipu.

9. Pomen gestagenov v nadomestnem hormonskem pomenopavznem zdravljenju je naslednji: (obkroži en odgovor)

a) opanikajo delovanju estrogenov pri učinku na vazomotorne simptome in na kostni metabolizem.

b prekomerno poraščenost po moškem tipu.

9. Pomen gestagenov v nadomestnem hormonskem pomenopavznem zdravljenju je naslednji:

(obkroži en odgovor)

a oponirajo delovanju estrogenov pri učinku na vazomotorne simptome in na kostni metabolizem

b oponirajo delovanju estrogenov na endometrij in tako zmanjšujejo možnost za nastanek endometrijskega karcinoma

11. V letih po menopavzi:

(obkroži en odgovor)

a Se poveča tvorba kosti in zmanjša kostna resorbcija

b Se zmanjša tvorba kosti in poveča kostna resorbcija

c Kostna tvorba in resorbcija ostanejo nespremenjene

12. Nevrovegetativni simptomi v perimenopavzi so povezani z:

(obkroži vse pravilne odgovore)

1 zmanjšano koncentracijo estrogenov

2 spremenjenim notranjim ravnovesjem

3 spremembami hipotalamično-hipofizno ovarijskih osi

4 stabilnostjo nevrovegetativnega sistema

13. Hormonsko nadomestno zdravljenje je indicirano:

(obkroži vse pravilne odgovore)

1 v pomenopavzi

2 pri primarnem hipogonadizmu

3 po kastraciji

4 pri slabo razvitih sekundarnih spolnih znakih

14. Gonadotropini se uporabljajo:

327 liste

(obkroži en odgovor)

Gonado tropini se uporabljajo?

- 1 za urejanje menstruacijskega ciklusa
- 2 za indukcijo ovulacije pri nerednih krvavitvah
- 3 za indukcijo ovulacije pri neplodnosti
- 4 pri cervikoistmični insuficienci

15. Hiperprolaktinemija lahko povzroča:

(obkroži vse pravilne odgovore)

- 1 galaktorejo <sup>izločanje mleku podobna tekočina</sup>
- 2 neplodnost
- 3 nereden ciklus
- 4 anosmijo

16. Sindrom policističnih ovarijev vključuje:

(obkroži vse pravilne odgovore)

- 1 anosmijo
- 2 povečano poraščenost
- 3 anovulacijo
- 4 povečanje telesne teže
- 5 neplodnost

17. Druga porodna doba traja:

(obkroži en odgovor)

- a od popolnega odprtja materničnega ustja do rojstva posteljice
- b od vstopa glavice v medenični kanal do rojstva glavice
- c od odprtja materničnega ustja do rojstva ploda
- d od rojstva ploda do rojstva posteljice

18. Kardiotokograf je naprava:

(obkroži en odgovor)

1. porodna doba: od začetka popadkov do popolnega odprtja materničnega ustja

3. porodna doba: od istise ploda do istise placente

Le ni stotokograf je naprava:

- a za spremljanje popadkov in plodovih srčnih utripov
- b za spremljanje srčnih utripov in gibanje otroka
- c za spremljanje pulza matere in srčnih utripov ploda

Prezgodnji porod je:

(obkroži en odgovor)

1 porod pred 32. tedni nosečnosti

2 porod pred 37. tedni nosečnosti

3 porod pred 42. tedni nosečnosti

PRAVOČASEN POROD 37. - 42. tedna

PREZGODNJI POROD pred 37. tednom

PREDČASEN POROD pred 28. tednom

ZAKASNEL POROD po 42. tednu

20. Predčasni razpok mehurja je:

(obkroži en odgovor)

1 razpok mehurja zgodaj v prvi porodni dobi - predno je

maternično ustje popolnoma odprto

2 razpok mehurja pred 37. tednom nosečnosti

3 razpok mehurja pred 32. tednom nosečnosti

4 razpok mehurja, predno še prično redni popadki

21. Poterminski porod je:

1 porod postmaturnega otroka po 42. tednu nosečnosti

2 je vsak porod po 40. tednu nosečnosti

22. Indukcija poroda je postopek:

(obkroži en odgovor)

1 za pospešitev poroda

2 za skrajšanje poroda

3 za dokončanje poroda

4 za sproženje poroda in dokončanje nosečnosti

23. S psihično pripravo na porod :

(obkroži en odgovor)

a poglobimo introvertiranost nosečnice

b dosežemo telesno in duševno sprostitvev porodnice

c dosežemo popolno neobčutljivost za bolečino med popadki

d oba partnerja čimbolj podrobno seznanimo z vsemi možnimi zapleti

med nosečnostjo in porodom.

25. Katera od prezentacij pri porodih v medenični vstavi je med

naštetimi najugodnejša :

(obkroži en odgovor)

1 zadnjična in zadnjično-nožna vstava

2 nožna vstava

3 kolenska vstava

4 kolensko-nožna vstava

?

26. Pri porodih v medenični vstavi je carski rez indiciran

kadar:

(obkroži en odgovor)

a otrok tehta več kot 3500 g

b otrok tehta med 2000- 2500g

c otrok tehta med 2500 -3000g

29. Vzroki neplodnosti pri neplodnem paru so:

(obkroži en odgovor)

- 1 večinoma pri ženski
- 2 večinoma pri moškem
- 3 približno pri obeh enako pogosti
- 4 ugotavljati vzrok neplodnosti sploh ni pomembno

30. Najpomembnejša in najpogostejša preiskava za ugotavljanje moške plodnosti oz. neplodnosti je:

357

(obkroži en odgovor)

- 1 spermogram
- 2 ultrazvočni pregled testisov
- 3 preiskava bukalne sluznice na spolni kromatin
- 4 kariogram
- 5 postkoitalni test PCT št. in gibanje spermijev v cervikalni sluzi

32. Obkroži najpogostejši vzrok za krvavitev v kasni nosečnosti:

nosečnosti

(obkroži en odgovor)

- 1 prezgodnja ločitev pravilno ležeče placente *sbrupcija placente*
- 2 raztrgana maternica
- 3 pretrgana žila na spolovilu in v nožnici
- 4 polip materničnega vratu
- 5 eritroplakija
- 6 karcinom materničnega vratu

2  
1

33. Pri prezgodnji ločitvi pravilno ležeče placente:

6

- 4 polip materničnega vratu
- 5 eritroplakija
- 6 karcinom materničnega vratu

33. Pri prezgodnji ločitvi pravilno ležeče placente :  
( obkroži en odgovor)

- 1 je zunanja krvavitev vedno sorazmerna notranji krvavitvi
- 2 **zunanja krvavitev največkrat ni sorazmerna notranji krvavitvi**

34. Kadar sumimo na spredaj ležečo placento ( placenta praevia )  
( obkroži en odgovor)

- 1 **nosečnico hospitaliziramo in porod čim bliže terminu poroda končamo s carskim rezom**
- 2 nosečnost vedno takoj dokončamo s carskim rezom
- 3 porod praviloma vodimo vaginalno
- 4 hospitalizacija sploh ni potrebna

37. Mb Down sodi med  
( obkroži en odgovor)

- a **numerične kromosomske anomalije**
- b avtosomne genopatije
- c monosomije
- e bolezni vezane na spolni kromosom X

38. Ko zdravimo žensko z znaki akutnega salpingitisa moramo pri zdravljenju upoštevati, da:

( obkroži en odgovor)

- 1) je najpogostejši povzročitelj N. gonorrhoe
- 2) **je najpogostejši povzročitelj C. trachomatis**
- 3) so povzročitelji največkrat anaerobne bakterije
- 5) da gre najpogosteje za polimikrobno infekcijo

39. Tveganje za pelvično vnetje je največje pri ženskah:  
( obkroži en odgovor)

- 1 srednjih let
- 2 **pri uporabnicah materničnega vložka**

- 3 pri ženskah, ki pogosteje menjavajo partnerje
- 4 ki uporabljajo oralno kontracepcijo
- 5 pri nuligravidah

40. Načrtovanje družine je :  
( obkroži en odgovor)

**1 odgovorno odločanje o rojstvu otrok**

- 2 gibanje za dovoljeni splav
- 3 gibanje za razvoj kontracepcije v razvitem svetu
- 4 gibanje za zmanjšanje naravnega prirastka prebivalstva v nerazvitem svetu

41. Oralna hormonska kontracepcija znižuje incidenco raka :  
( obkroži tri odgovore)

- 1 nožnice
- 2 jajcevodov
- 3 endometrija**
- 4 materničnega vrata
- 5 širokega črevesa
- 6 jajčnikov**

43. Najpomembnejši dejavnik tveganja za cerebrovaskularni inzult pri jemanju OKC je:  
( obkroži en odgovor)

- 1 starost po 35 letu
- 2 kajenje in starost po 35 letu**
- 4 revmatizem
- 5 menjavanje spolnih partnerjev

44. Kakšne kontracepcije najraje ne bi priporočili mladoletnicam?  
( obkroži en odgovor)

- 1 oralne kontracepcije
- 2 mehanične kontracepcije
- 3 kemične kontracepcije
- 4 menjavanje spolnih partnerjev**



5 menjavanje spolnih partnerjev

44. Kakšne kontracepcije najraje ne bi priporočili mladostnicam?

(obkroži en odgovor)

1 oralne kontracepcije

2 mehanične kontracepcije

3 kemične kontracepcije

4 intrauterinih vložkov

45. Pri katerih nosilkah materničnih vložkov je tveganje za 197

vnetje rodim povečano?

(obkroži en odgovor)

1 nuligravidah mlajših od 25 let

2 ženskah, ki menjavajo spolne partnerje

3 ženskah nad 40 let

4 ženskah po arteficialnem abortusu

46. Če ženska, ki uporablja intrauterini maternični vložek 193-197

zanosi, obstaja povečano tveganje:

(obkroži en odgovor)

1 za intrauterini zastoj rasti ploda

2 za ektopično nosečnost in spontani splav

3 za predležčo posteljico

4 za predčasno ločitev pravilno ležeče posteljice

5 za prirojene malformacije ploda

47. Za prekinitvev nosečnosti v prvih tednih gestacije uporabljamo: 221

(obkroži vse pravilne odgovore)

1 endometrijsko aspiracijo *menstrualna aspiracija, 5-7. teden*

2 aplikacija prostaglandinov

3 aplikacijo antiprogestinov Ru 486

4 dilatacijo in kiretažo <sup>abrazija</sup>

5 mali carski rez

49. Kateri med naštetimi infektivnimi dejavniki ni teratogen:

(obkroži en odgovor)

1 citomegalovirus

2 rubella

3 toksoplasma gondii

4 chlamydia trachomatis

5 parvovirus B 19

51. Katero od obeh zdravil je teratogeno:

(obkroži en odgovor)

1 penicilin

2 talidomid

52. Kateri diagnostični postopek uporabljamo za ugotavljanje Rh iz imunizacije:

(obkroži en odgovor)

1 Indirektni Coombsov test  $\checkmark$

2 Ultrazvočno preiskavo

3 Nelsonov test

53. IgG Anti D apliciramo Rh negativni ženski z negativnim Indirektnim Coombsovim Testom :

(obkroži vse pravilne odgovore)

1 v 72 urah po porodu

2 po splavu

3 po amniocentezi

4 v 28. tednu nosečnosti

5 po kordocentezi

6 pri biopsiji horionskih resic

54. Dejavniki tveganja, zaradi katerih moramo iskati gestacijski

diabetes:

(obkroži dva pravilna odgovora)

1 prejšnji otrok: makrosomen

2 intrauterina smrt v prejšnji nosečnosti

3 oligohidramnion v prejšnji nosečnosti

4 prezgodnji porod v prejšnji nosečnosti

55. Pri bolnici s sladkorno boleznijo, odvisno od insulina, se

potrebe po insulinu v nosečnosti običajno:

(obkroži en odgovor)

1 zvišajo

2 znižajo

3 ostanejo enake

56. Prostornina rdečih krvničk se poveča v nosečnosti za

(obkroži en odgovor)

10-15 ml/kg - ( 20% )

2 25-30 ml/kg - ( 45% )

3 40-70 ml/kg - ( 80% )

57. Če je zaradi umetne srčne zaklopke potrebno antikoagulatívno

zdravljenje v nosečnosti predpišemo:

(obkroži en odgovor)

56. Prostomina rdečih krvničk se poveča v nosečnosti za  
(obkroži en odgovor)

- 1 10-15 ml/kg - ( 20% )
- 2 25-30 ml/kg - ( 45% )
- 3 40-70 ml/kg - ( 80% )

57. Če je zaradi umetne srčne zaklopke potrebno antikoagulativno zdravljenje v nosečnosti predpišemo:  
(obkroži en odgovor)

- 1 kumarinski preparat, ker ga nosečnica jemlje per os in ni teratogen
- 2 heparin, ki slabo prehaja skozi posteljico

58. Nosečnost odsvetujemo, če je serumski kreatinin  
(obkroži en odgovor)

- 1 večji od 72  $\mu\text{mol/l}$
- 2 večji od 125  $\mu\text{mol/l}$
- 3 večji od 250  $\mu\text{mol/l}$

59. Akutni pyelitis v nosečnosti pravilno zdravimo  
(obkroži en odgovor)

- 1 z antibiotiki, na slepo
- 2 samo z uroantiseptiki
- 3 z antibiotiki, po izvidu urinokulture in antibiograma

60. Kaj je blastocista  
(obkroži en odgovor)

- 1 rumenjaka vrečka
- 2 faza v razvoju zarodka
- 3 velik jajčnikov folikel

61. Katere plasti tvorijo jajčne ovoje  
(obkroži en odgovor)

- 1 amnion, chorion laeve, decidua capsularis
- 2 amnion, chorion frondosum, decidua basalis

62. Kako sledimo razvoju in rasti ploda?  
(obkroži en odgovor)

1. s klinično in s hormonskimi preiskavami

**2. klinično in z ultrazvočno preiskavo**

3. z nuklearno magnetno resonanco

63. Kako nastaja plodovnica?  
(obkroži en odgovor)

1. je izoliran produkt kožnih žlez ploda

**2. izloča se le na amnijski membrani posteljice in popkovnice**

3. plodovnica nastaja le v pljučih oziroma v bronhialnem vejevju ploda

4. plodovnica je deloma materinega in deloma fetalnega porekla

64. Mehanizem porajanja glavice vključuje  
(obkroži en odgovor)

**1. sklanjanje, napredovanje, notranje sukanje, iztegovanje in zunanje sukanje**

2. le notranjo in zunanjo rotacijo

3. sklanjanje, notranja rotacija in lateralno fleksijo

65. Partogram **grafični zapis spremljanja poteka poroda**  
(obkroži en odgovor)

- 1 je grafični zapis plodovih srčnih utripov in popadkov
- 2 je grafični zapis odpiranja materničnega ustja in napredovanja plodove glavice skozi porodno pot
- 3 je ultrazvočna preiskava ploda med porodom

**4 je sinonim za porodni zapisnik**

66. Princip rizičnosti v nosečnosti

(obkroži en odgovor)

- 1 je ocenjevanje materinih vitalnih znakov v nosečnosti
- 2 je metoda za ugotavljanje nevarnosti dejavnikov okolja na nosečnost
- 3 je princip ugotavljanja ogroženosti nosečnice ali ploda za nastop določene komplikacije v nosečnosti ali med porodom**

67. Kaj je placentarna insuficienca?

(obkroži en odgovor)

- 1 drugo ime za abrupcijo o placente

**2 zelo ohlapna definicija nepravilnega delovanja posteljice**

- 3 četrta stopnja zrelosti posteljice

68. Kako ugotovimo akutno placentarno insuficienco?

(obkroži en odgovor)

kako ugotovimo ac. placentarno insuficienco?

1 Klinično, s kardiotokografijo in pH metrijo plodove krvi

2 Z ultrazvočno preiskavo med nosečnostjo

3 Le klinično

69. Kardiotokografija je  
(obkroži en odgovor)

1 metoda za ugotavljanje srčne funkcije matere in aktivnosti maternice (popadkov) med porodom

2 metoda za sočano beleženje frekvence plodovih srčnih utripov in aktivnosti maternice

3 metoda za ugotavljanje srčnih anomalij ploda

4 metoda za ugotavljanje nepravilnosti popadkov

72. Osnovna razdelitev nepravilnih popadkov

(obkroži en odgovor)

a hipertonični, hipotonični, nekoordinirani popadki

b Koordinirani in nekoordinirani popadki

d descendentni in ascendentni popadki

73. Ukrepi pri zastoju poroda:

Izberite najboljši način ukrepanja

a stimuliramo popadke

b napravimo carski rez

c s porodniško preiskavo ugotovimo razlog za zastoj in glede na fazo poroda ustrezno ukrepamo

74. Najmanjše je petletno preživeje pri

Najmanjše je petletno preživetje pri:

(obkroži en odgovor)

1 karcinomu materničnega vratu 60-90% (I, II) 30% (III, IV)

2 karcinomu materničnega telesa

3 karcinomu ovarija 25-30%

75. Najpomembnejši prognostični faktor pri cervikalnem karcinomu je

(obkroži en odgovor)

a razširjenost tumorja

b histološki tip in stopnja histološke diferenciacije

76. Kateri od obeh naštetih hormonov ne nastaja v placenti:?

(obkroži en odgovor)

1) humani horionski gonadotropin

2) luteinizirajoči hormon (LH)

77. Katera trditev je za progesteron napačna?

(obkroži en odgovor)

1) progesteron znižuje tonus gladkih mišic

2) progesteron je predstopnja testosterona

3) do 9 tedna nosečnosti nastaja progesteron predvsem v rumenem telescu jajčnika



78 Koliko merijo premeri medeničnega vhoda normalne ženske medenice:  
(obkroži en odgovor)

1) prečni 20cm, vzdolžni 14cm

2) prečni 10 cm, vzdolžni 13 cm

3) prečni 13 cm, vzdolžni 11-12 cm,

4) prečni 15 cm, vzdolžni 10 cm

79 Arteria ovarica poteka :  
(obkroži en odgovor)

1) skozi proksimalni del mezosalpinksa

2) skozi uteroovarijski ligament

3) skozi infundibulopelvični ligament

4) skozi ligamentum rotundum

80 Katera žila preskrbuje zunanje genitalije  
(obkroži en odgovor)

1) arteria femoralis

2) arteria pudenda interna

3) arteria ovarica

4) arteria mesenterica inferior

81 Arteria uterina je veja  
(obkroži en odgovor)

1) a. iliaca externa

81 Arterije uterina je veje:

- 1) a. iliaca externa
- 2) a. iliaca interna
- 3) a. pudendae interna
- 4) a. ovaricae
- 5) a. femoralis

82 Fiziološko se telesna teža nosečnice med nosečnostjo poveča za: (obkroži en odgovor)

1) 10 - 12 kg

2) 20 in več kg

3) 4-5 kg

83 Kolikšna je teža normalne posteljice?

(obkroži en odgovor)

1) 200-400 g

2) 400-600 g

3) 1/2 teže novorojenca

4) 1/3 teže novorojenca

84 Kateri odgovor na vprašanje o funkciji ledvic med nosečnostjo je pravilen?

(obkroži en odgovor)

1) glomerularna filtracija ostane nespremenjena

2) glomerularna filtracija se poveča za 50%

85 Ciklične hormonske spremembe se izražajo tudi na materničnem vratu ter v sluzi materničnega vratu. Pod vplivom progesterona:

(obkroži en odgovor)

1) se kanal materničnega vratu zoži

2) postane sluz materničnega vratu bolj vlecljiva

3) sluz materničnega vratu tipično kristalizira

4) se sluz materničnega vratu izliva v obliki slapu

87 Kaj je ovulum Nabothi?

(obkroži en odgovor)

1) jajčnikov folikel pred ovulacijo

2) retencijska cista v jajčniku

3) sinonim za blighted ovum

4) prvi in drugi odgovor sta pravilna

5) retencijska cista v predelu nožničnega dela maternice

88 Kako dokažemo tuberkulozni endometritis?

(obkroži en odgovor)

1) z merjenjem bazalne temperature

2) s pregledom menstrualne krvi na BK

3) s Schillerjevim testom

4) kolposkopsko

5) s pomočjo vaginalne citologije

89 Gibanje ploda začuti nosečnica:?

(obkroži en odgovor)

1) navadno po 28 tednu nosečnosti

2) v 18-20 tednu nosečnosti

3) navadno v 12. tednu nosečnosti

4) ko posteljica prevzame funkcijo rumenega telesca

90 Z laboratorijskimi in biološkimi poskusi dokazujemo nosečnost na osnovi določanja:

(obkroži en odgovor)

Z laboratorijskimi in biološkimi poskusi dokazujemo nosečnost na osnovi določanja:

- 1) estriola
- 2) estradiola
- 3) progesterona
- 4) horionskega somatotropina

5) horionskega gonadotropina

91) 37 letna ženska toži o kontaktnih krvavitvah. Katero od naštetih preiskav boste indicirali?:  
(obkroži en odgovor)

- 1) laparoskopijo
- 2) vaginalni ultrazvok
- 3) histeroskopijo

4) klinični pregled s kolposkopijo, citologijo in morebitno biopsijo

5) Nobeno od naštetih preiskav

93 Koliko meri normalno dolga maternica pri nuligravidi v reproduktivnem življenjskem obdobju?:

(obkroži en odgovor)

- 1) 3-5 cm
- 2) 6-8 cm
- 3) 10-12 cm
- 4) 12-14 cm

94 Po mednarodni klasifikaciji razdelimo karcinom materničnega vratu na štiri stadije (I, II, III, IV) glede na ?:

(obkroži en odgovor)

1) glede na histološki tip

- 2) glede na makroskopski pregled operativnega preparata
- 3) glede na stopnjo tkivne dediferenciacije

4) glede na palpatorni izvid in izvid pregleda v spekulih

95 Pri Schillerjevem ( jodnem ) testu se rjavo obarva:

( obkroži en odgovor )

- 1) ploščati epitel , ki normalno leži v predelu endocerviksa
- 2) cilindrični epitel endocerviksa
- 3) močno displastični epitel
- 4) ploščati epitel materničnega vratu, ki vsebuje glikogen.

96 Za adrenogenitalni sindrom so tipične povišane koncentracije:?

( obkroži en odgovor )

- 1) gestagenov
- 2) estradiola
- 4) dehidroepiandrostendiona
- 5) kortizola

97 S kakšnim postopkom diagnosticiramo karcinom korpusa uteri ?:

( obkroži en odgovor )

- 1) s citološko preiskavo
- 2) s kolposkopijo
- 3) s pregledom v spekulih in bimanuelno ginekološko preiskavo
- 4) s histerosalpingografijo
- 5) z frakcionirano abrazijo

98 Kateri simptom je značilen za submukozni miom \_

( obkroži en odgovor )

- 1) sekundarna amenoreja
- 2) kontaktna krvavitev
- 3) bolečina v sredini ciklusa
- 4) hipomenoreja
- 5) menoragija in dismenoreja

99 V zgodnji menopavzi so gonadotropini v primerjavi z gonadotropini v reproduktivnem obdobju? \_

( obkroži en odgovor )

- 1) nižji

- 2) nespremenjeni
- 3) **povišani**
- 4) se sploh ne izločajo več
- 5) tipično je povečano razmerje med LH in FSH

101 **Naslednja trditev o endometriozii je pravilna:?**  
(Obkroži en odgovor)

**1. Tipična sptoma sta dismenoreja in sterilnost**

2. Tipični simptom je oligomenoreja
3. Tipično je, da se pojavi se pri nosilkah IUD
4. Tipično je, da se težave se v postmenopavzalnem obdobju še poslabšajo
5. Napogosteje se pojavi pri ženskah, ki uporabljajo oralno hormonsko kontracepcijo

102 **Ektopična nosečnost se najpogosteje dogodi pri ženskah:?**  
(Obkroži en odgovor)

**1) ki so prebolele pelvična vnetja**

- 2) ki imajo endometriozo 1. stopnje
- 3) ki so uporabljale oralno hormonsko kontracepcijo
- 4) pri ženskah, ki imajo v anamnezi nekompliciran arteficialni splav
- 5) pri ženskah, ki so bile v otroštvu operirane zaradi nekompliciranega slepiča.

103 **Kaj je konizacija:?**  
(Obkroži en odgovor)

- 1) posebno barvanje po Cohenu
- 2) Klinasto izrezanje jajčnika zaradi policistične bolezni jajčnika
- 3) **Stožčasto izrezanje materničnega vratu**
- 4) Operacija na materničnem vratu pri karcinomu stadija I.b.
- 5) Kolposkopsko ciljana biopsija materničnega vratu

105 **Pogosta posledica prebolelih pelvičnih vnetij je:**

Pogosta posledica prebolelih pelvičnih vnetij je:

(Obkroži en odgovor)

- 1) **ektopična nosečnost v jajcevodu**
- 2) karcinom jajcevoda
- 3) karcinom jajčnika
- 4) ektopična nosečnost v materničnem vratu
- 5) hidronefroza

106 Kateri karcinom med spodaj naštetimi je najpogostejši  
(Obkroži en odgovor)

- 1) Karcinom vagine
- 2) Karcinom ovarijskega
- 3) Karcinom materničnega vratu
- 4) Karcinom na telesu maternice
- 5) **Karcinom dojke**

107 20 letno dekle navaja pogosto mokrenje, napeta prsa, amenorejo, ki traja dva meseca, rahlo povišano temperaturo, občasne slabosti. Najverjetneje gre za:  
(Obkroži en odgovor)

- 1) hipofizni tumor
- 2) diabetes mellitus
- 3) granuloma celičnega
- 4) sindrom policističnih jajčnikov
- 5) **nosečnost**

108 Kje se tvori GnRH  
(Obkroži en odgovor)

- 1) v sprednjem režnju hipofize
- 2) v zadnjem režnju hipofize
- 3) v češeriki
- 4) **v hipotalamusu**
- 5) v celicah citotrofoblasta

109 Kateri od naštetih simptomov je najznačilnejši za karcinom jajčnika  
(Obkroži en odgovor)

- 1) dyspareunia

- 2) ascites
- 3) menorrhagia
- 4) jantarni iztok iz nožnice**
- 5) dysmenorrhoe

110 Kot posledica endometrioze se lahko dogodi naslednje:?

(Obkroži vse možnosti)

- 1) Akutna abdominalna simptomatika zaradi ruptura čokoladne ciste jajčnika
- 2) Maligna alteracija
- 3) Proktoragija v času menstruacije**
- 4) Hematuria v času menstruacije**

111 Kakšna je kemična zgradba GnRH

(Obkroži en odgovor)

- 1) je decapeptid
- 2) je steroid**
- 3) je glikoprotein
- 4) je nezasičena maščobna kislina
- 5) je tripeptid

112 Kako si razlagamo obstipacijo v zgodnji nosečnosti

(Obkroži en odgovor)

- 1) s pritiskom povečane maternice na tanko črevo
- 2) s pomanjkanjem zelenjave v prehrani nosečnice
- 3) z vplivom progesterona na gladke mišice**
- 4) z elektrolitskim neravovesjem zaradi jutranjega bruhanja
- 5) z direktnim vplivom horionskega gonadotropina na gladko mišičje debelega črevesa

113 Kaj je razumemo pod pojmom nizki sedež placente

(Obkroži en odgovor)

- 1) horionske resice vraščajo globoko v miometrij
- 2) horionske resice vraščajo do peritoneja
- 3) placenta sega do notranjega materničnega ustja vendar ga ne prekriva**
- 4) placenta delno prekriva notranje maternično ustje



5) placenta popolnoma prekriva notranje maternično ustje

114 Pri pregledu neplodnega para najdemo vzrok neplodnosti samo pri moškem ?:

(Obkroži en odgovor)

- 1) v 5-10 %
- 2) v 30-40 %
- 3) v 60-70 %
- 4) v 75 %

118 Pri ženski s sladkorno boleznijo je fertilna sposobnost ženske:

(Obkroži en odgovor)

- 1) povečana
- 2) nespremenjena
- 3) zmanjšana le v primeru ketoacidoze
- 4) zmanjšana tudi v primeru ustreznega zdravljenja
- 5) nespremenjena - če diabetes odkrijemo in ustrezno zdravimo

119 Kaj je sactosalpinks serosa

(Obkroži en odgovor)

- 1) Vrečasto razširjen zaprt jajcevod napolnjen s serozno tekočino (ampularni del)
- 2) Z gnojem napolnjen in zaprt jajcevod
- 3) Ektopična nosečnost v stadiju spontane regresije

121 Oralna hormonska kontraceptiva:

(Obkroži en odgovor)

- 1) Zavirajo razvoj zigote
- 2) Zavirajo sekrecijo gonadotropinov in stem ovulacijo

## Orelna hormonska kontraceptiva (kontracepcija)

- 3) Povzročajo spazem proksimalnega dela jajcovoda
- 4) **Preprečujejo implantacijo zarodka v stadiju blastociste**

122 Kakšen pomen ima retrofleksija sicer premakljive maternice  
(Obkroži en odgovor)

- 1) Je najpogostejši vzrok za bolečine v križu
- 2) **Najpogosteje ne pomeni nič posebnega**

123 Glandularno cistična hiperplazija je posledica:

- 1) perzistence jajčnikovega folikla
- 2) perzistence rumenega telesca
- 3) **nenadnega padca koncentracije progesterona v drugi polovici ciklusa**
- 4) znižane koncentracije FSH
- 5) hipoestrogenemije

125 Kaj sodi v Aschermannov sindrom? \_  
(Obkroži en odgovor)

- 1) Amenoreja in panhipopituitarizem
- 2) Amenoreja in galaktoreja po porodu
- 3) Oligomenoreja, hirsutizem, debelost in neplodnost
- 4) **Zarastline v maternici in amenoreja**

126 Kadar zunaj nosečnosti miom na maternici povzroča močne bolečine, svetujemo :  
(Obkroži en odgovor)

- 1) **operativno zdravljenje**
- 3) analgetika do spontanega regresa v pomenopavzalnem obdobju
- 5) visoke doze estrogenov

127 Močne krvavitve zaradi miomov na maternici navadno nastanejo :  
(Obkroži en odgovor)

Močne krvavitve zaradi miomov na maternici nevedno nastanejo?

- 1) zaradi intraligamentarnih miomov
- 2) zaradi submukoznih miomov
- 3) zaradi pecljatih miomov, ki so se zrasli z ometumom, ki jih bogato oskrbuje s krvjo
- 4) zaradi majhnih miomov, ki ležijo intramuralno
- 5) zaradi degeneracije subseroznih miomov

**MENORAGIJA** obilne podaljšane menstr. krvavitve, Traja 7-14 dni.

**AMENOREJA** izostanek menstruacije

**DISMENOREJA** boleča menstruacija

**HIPOMENOREJA** šibke menstr. krvavitve, ki traja nekaj ur, en dan

**HIPERMENOREJA** obilne nenormalno močne menstruacije. 7 dni

**OLIGOMENOREJA** podaljšani ciklusi, krvavitve se pojavijo na 35 do 62 dni

**POLIMENOREJA** skrajšani ciklusi, krvavitve se pojavijo na manjše 21 dni

**METORAGIJA** neredne krvavitve iz maternice ki niso povezane z menstrualnim ciklom