

IZPIT IZ GINEKOLOGIJE IN
PORODNIŠTVA – VISOKA ŠOLA ZA
ZDRAVSTVO, IZREDNI ŠTUDIJ

1. Z Lugolovo raztopino obarvamo zdravo sluznico materničnega vratu in vagine:
 - Rjavo
 - Modro
 - Belo
2. Kolposkopija je metoda, s katero opazujemo:
 - Vulvo
 - Maternični vrat
 - Maternično votlino
3. Kuldocenteze ne izvajamo pri:
 - Sumu na karcinom jajčnika
 - Sumu na intraabdominalno krvavitev
 - Abscesu Doulasovega žepa
4. Pri sumu na zunajmaternično nosečnost, laboratorijsko spremljamo koncentracijo:
 - CA 125
 - AFP
 - FSH
 - β HCG
5. Akutno pelvično bolečino lahko povzročijo:
 - Vnetje v mali medenici
 - Krvavitev v peritonealno votlino
 - Motnje v prekrvavitvi organov medenice
 - Nepravilnosti zgodnje nosečnosti
 - Tumorji
 - Raztezanje genitalnih organov
6. Stalna kronična bolečina je pogosta pri:
 - Endometriozi
 - Dismenoreji
 - Premenstrualnem sindromu
7. Ovulacijska bolečina se pojavlja:
 - V sredini menstruacijskega ciklusa
 - Ob začetku menstruacijskega ciklusa
 - Ob koncu menstruacijskega ciklusa
8. Hipofiza izloča:
 - FSH
 - LH
 - Estradiol
 - Progesteron
9. Nepravilnim krvavitvam iz maternice je najpogostejši vzrok:
 - disfunkcionalna krvavitev
 - organska krvavitev
10. Obilno in podaljšano menstruacijo (več kot 7 dni, manj kot 14 dni) imenujemo:
 - menoragija
 - menometroragija
 - hipermenoreja
11. Primarna dismenoreja je pogosta:
 - pri mladih dekletih
 - pri perimenopavzalnih ženskah
12. Klinični znaki – povišana temperatura, mrzlica, bolečina v spodnjem delu trebuha, slabost, bruhanje, gnojni izcedek iz rodir – govori za:
 - vnetje rodir
 - zunajmaternično nosečnost
 - karcinom rodir
13. Vzrok kondilomov zunanjega spolovila je infekcija z:
 - Humanimi papiloma virusi
 - Herpes simplex virusom
 - Treponemo pallidum
 - Naisserio gonorrae
14. Nastanek tubo-ovarijskega abscesa povezujemo z:
 - Vstavljenim intrauterinim vložkom
 - Zunajmaternično nosečnostjo
 - Uroinfektom
15. Najpogostejši vzrok za spontani splav je:
 - razvojne nepravilnosti in bolezni maternice
 - kromosomski vzroki
 - bolezni matere (srčna obolenja, jetrne bolezni...)
 - imunološki vzroki
16. Tujka "abortus imminens" pomeni:
 - začetni splav
 - grozeči splav
 - potekajoči splav
 - popolni splav
 - nepopolni splav
17. Pri zunajmaternični nosečnosti se oplojeno jajčece najpogosteje implantira v:
 - jajcevodu
 - jajčniku
 - kanalu materničnega vratu
 - peritonealni votlini
 - maternični votlini