

18. Pri zunajmaternični nosečnosti je bolnica živlensko ogrožena zaradi:
- nastanka tubo-ovarijskega abscesa
  - nastanka Mole hydatidose
  - intraabdominalne krvavitve
19. Katerega izmed opisanih znakov ne opazujemo pri zunajmaternični nosečnosti:
- lažja zunanja krvavitvev, lahko le rjav izcedek
  - močna zunanja krvavitvev
  - bolečina v spodnjem delu trebuha
  - Vrtoglavica, bledica, padec krvnega pritiska, slabo tipliv in hiter pulz
20. Pri zunajmaternični nosečnosti je koncentracija  $\beta$  HCG v serumu:
- zvišana
  - znižana
21. Najpogostejši tumor rodil je:
- karcinom materničnega vratu
  - miom maternice
  - sarcoma botrioides
  - fibrom vulve
22. Pri krvavitvi iz maternice pri ženski v pomenopavzalnem obdobju pomislimo sprva na:
- karcinom materničnega telesa
  - abortus imminens
  - endometritis
23. CIN III uvrščamo med:
- premaligne spremembe materničnega vratu
  - začetni karcinom materničnega vratu
  - karcinom materničnega vratu
24. Teratom – dermoidna cista – spada med:
- epitelne tumorje jajčnika
  - tumorje zarodnih celic
  - stromalne tumorje jajčnika
25. S presejalnimi (screening) metodami naj bi znižali incidenco:
- karcinoma materničnega vratu
  - karcinoma materničnega telesa
  - ovarijskega karcinoma
26. Kaj ni znak normalnega začetka poroda:
- redni popadki na 5 minut
  - krvav, sluzav čep
  - spontan razpok plodovih ovoiev
27. Katera faza poroda se začne s popolnim odprtjem materničnega kanala in traja do popolnega rojstva otroka:
- prva porodna doba
  - druga porodna doba
  - tretja porodna doba
  - četrta porodna doba
28. Vaginalno dokončanje poroda ni možno pri:
- zatilni vstavi
  - temenski vstavi
  - medenični vstavi
  - čelni vstavi
  - obrazni vstavi
29. Placenta praevia pomeni:
- predležča posteljica
  - prezgodnja ločitev pravilno ležeče posteljice
30. Pri prezgodnji ločitvi pravilno ležeče posteljice je živlensko ogrožena:
- mati
  - plod
  - oba