

## VPRAŠANJA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI

1. Najpogostejši vzrok za ↑ TT nejasnega vzroka

- a.) maligna obolenja
- b.) okužbe**
- c.) centralna temperatura

2. Značilne kožne bolezni pri Ly. BORELIOZI

- a.) erithema cronicum migrans**
- b.) acrodermatitis cronica atrophicans
- c.) eymphocitonia

3. Roseole so značilne za:

- a.) ošpice
- b.) rdečke
- c.) tifus**
- d.) inf. Mononukleozo

4. »USHER« črni pršič lahko najdemo pri:

- a.) mrzlici
- b.) antraksu**
- c.) šen
- d.) toksoplzmozi

5. KONTINUA T je značilna za:

- a.) maligne bolezni
- b.) tifus**
- c.) brucelozza
- d.) sepsa

6. Z izrazom »TRANSLOKACIJA« bakt. mislimo na:

- a.) prenos bakterije od bolnika k bolniku
- b.) prehod bakterije preko črevesne stene**
- c.) kolonizacija dihal zaradi prehoda
- d.) kolonizacija žrela

7. CLOSTRIDIUM DIFFICILLE povzroča:

- a.) hude septične sepe
- b.) hude bol. driske**
- c.) hude bol. pljučnice

8. Med BETA LAKTANSKE antibiotike NE spada:

- a.) aminopenalin
- b.) cefalosporin
- c.) ureidopenicilin
- d.) aminoglikozid**

9. Okužbe z MRSA zdravimo z:

- a.) antistafilokoknim penicilinom
- b.) makrolidi
- c.) glikopeptidi.**

10. POSTIJEV znak vidimo pri:

- a.) ošpicah
- b.) škrlatinki**
- c.) rdečkah
- d.) noricah

11. O (epidemičnem) bakterijskem meningitisu govorimo, kadar je povzročitelj:

- a.) meningokok**
- b.) pnevmokok
- c.) gonokok
- d.) stafilokok

12. Pojav Herpesa zostra je lahko posledica:

- a.) nove okužbe
- b.) reaktivacije virusa
- c.) obeh**

13. Poškodovanec, ki je bil normalno bazično cepljen proti tetanusu in je od zadnje revakcinacije poteklo več kot 10 let mora ob globoki in umazani rani prejeti zaščito proti tetanusu:

- a.) cepivo in imunoglobuline**
- b.) samo cepivo
- c.) samo imunoglobuline
- d.) ničesar

14. Psevdo membranozna angina je značilna za:

- a.) streptokokno angino
- b.) stafilokokno angino
- c.) infekcijsko mononukleozo**
- d.) herp angino

15. Pri ošpicah in inf. mononukleozi lahko dobi podoben izpuščaj, vendar je znak, ki oba loči:  
Za ošpice:

- a.) povečane bezgavke
- b.) tipična krvna slika
- c.) koplihove pege**

Za inf. mononukleozo:

- a.) povečane bezgavke
- b.) koplihove pege
- c.) tipična krvna slika**

16. Hepatitis A se prenaša:

- a.) po oralno – fekalni poti**
- b.) s krvjo
- c.) po dihalnih poteh

In značilno zanj je:

- a.) da pogosto poteka kronično
- b.) da redko poteka kronično**

17. Dolga evolucija pri tetanusu:

- a.) hud potek
- b.) blažji potek**

18. Najpomembnejši povzročitelj pljučnice pri odraslih je:

- a.) S. aureus
- b.) E. coli
- c.) pnevmonije**
- d.) V. influence

19. Klinična slika G neg. šoka je:

- a.) bakterijska sepsa
- b.) endotoksini**
- c.) eksotoksini

20. Klop Ixodes r. je prenašalka:

- a.) meningoencefalitis
- b.) erlihoza
- c.) vse našteto**
- d.) Lymska borelioza

21. Določi lastnosti likvorja:

Bakterijsko vnetje: b, e, c

Virusno vnetje: a, d

Tuberkulozno vnetje: a, d, e

- a.) bister
- b.) moten
- c.) št. celic > 1000
- d.) št. celic < 500
- e.) ↓glukoza v likvorju ???
- f.) v likvorju nezrele ???

22. Pri akutnem obolenju otrok z vročino, če so pikčaste petehije, pomislimo:

- a.) bolezen krvotvornih organov
- b.) pokanje kapilar
- c.) meningokokno sepso**

23. Najpogostejši povzročitelj bakterijskega meningitisa pri odraslih:

- a.) Neiseria
- b.) E. coli
- c.) pnevmonije**

24. Dvofazni potek bolezni je značilen za:

- a.) klopni meningitis**
- b.) Lym. boreliozo
- c.) herpetični encefalitis

25. Herpes S. 1 ne povzroča:

- a.) Herpes labialis
- b.) encefalitis
- c.) herpangino**
- d.) herpeksem
- e.) gingivostomatitis

26. Povzročitelj infekcijske mononukleoze je:

- a.) beta hemolitični streptokok skupine A
- b.) Epstein – barr virus**
- c.) arbo virus

27. ↑ TT in mrzlica sta značilni za:

- a.) bakterijsko okužbo**
- b.) virusno okužbo

28. Lumbalno punkcijo v sedečem položaju izvedemo pri sumu na:

- a.) serozni meningitis brez povisjene intrakranialne pritiska**
- b.) pri tuberkuloznem meningitisu
- c.) pri sumu na subarahnoidalno krvavitev

29. Za atipične okužbe – katero skupino antibiotikov uporabljam?

Odg.) Makrolit

30. Filatobljev trikotnik je značilen za:

- a.) rdečke
- b.) ošpice
- c.) škrlatinko**