

A - kar je dopisano v ležeči pisavi so komentarji

1. MED KVANTITATIVNE MOTNJE ZAVESTI SPADAJO:

- a) Somnolenca
- b) Sopor
- c) Delirij
- d) Koma
- e) Zamračenost

Pravilni odgovori a, b, d

2. POSTOPEK FORMALNEGA UGOTAVLJANJA VSEBUJE:

- a) natančno upoštevanje izodiščnih pogojev
- b) ugotovitev kliničnih znamenj možganske smrti
- c) le ugotavljanje prenehanja delovanja obeh hemisfer velikih možganov
- d) dopolnilne instrumentalne preiskave
- e) dokaz ireverzibilnosti prenehanja možganskih funkcij

a,b,d,e

3. NAJHUJŠA OBLIKA SEK. MOTNJE INTELIGENCE JE:

- a) idiotija
 - b) demenca
 - c) oligofrenija
- **GLAVNI SIMPTOM PRI TEJ OBLIKI JE:**
- d) afazija
 - e) apraksija
 - f) motnja spomina

b, f

4. DESNA HOMONIMNA HEMIANOpsija KAŽE NA OKVARO:

- a) desnega vidnega živca (=nazalni del)
- b) optične hiazme
- c) levega optičnega traktusa
- d) desnega optičnega traktusa
- e) desnega zatilnega režnja

a, c

5. ZA HORNEJEV SINDROM JE ZNAČILNO:

- a) da je očesna reža razširjena
 - b) da je očesna reža zožena (=ptoza)
 - c) midriaza
 - d) mioza
 - e) eksoftalmus (enoftalmus)
- **IN NASTANE PRI OKVARI:**
- f) simpatičnih poti oz vlaken
 - g) parasimpatičnih vlaken
 - h) n. okulomotoriusa
 - i) n. oftalmikusa
 - j) m. vazokonstriktor pupile

b ,d, f, h

6. PRI POPOLNI OKVARI III MOŽGANSKEGA ŽIVCA NASTANE:

- a) ptoza
- b) mioza
- c) midriaza
- d) divergentni strabizem
- e) diplopija

a, c, d

7. PRI OKVARI SPODNJEGA MOTORIČNEGA NEVRONA NASTANE:

- a) pareza
- b) atrofija mišic
- c) hiperrefleksija
- d) hiporefleksija, arefleksija
- e) spastičnost

a, b, d

8. PRI OKVARI SPINOTALAMIČNE POTI V TORAKALNEM SEGMENTU HRBTENJAČE NA DESNI STRANI UGOTOVIMO:

- a) senzibilitetni izpad disociranem tipu na levi spodnji okončnini
- b) senzibilitetni izpad disociranem tipu na desni spodnji okončnini
- c) senzibilitetni izpad disociranem tipu na levi zgornji in spodnji okončnini
- d) izgubo globoke senzibilitete na desni spodnji okončnini
- e) izgubo globoke senzibilitete na levi spodnji okončnini

a, d

9. PERONEALNO HOJO VIDIMO PRI OKVARI:

- a) tibialnega živca
- b) peronealnega živca
- c) dorzifleksorjev stopal
- d) piramidne poti
- e) bazalnih ganglijev

b, c

10. PRI GERSTMANOVEM SINDROMU UGOTOVIMO:

- a) agnozijo prstov
- b) apraksijo levece
- c) agrafijo
- d) akalkulijo
- e) dezorietacijo levo-desno

a, c, d, e

11. NAJPOMEMBNEJŠI DEJAVNIKI TVEGANJA ZA MOŽGANSKO KAP: (verjetno)

- a) arterijska hipertenzija
- b) atrijska fibrilacija
- c) kronična pljučna obstruktivna bolezen
- d) sladkorna bolezen
- e) hiperlipidemija

a, b

12. TIPIČNA MESTA ZA HIPERTENZIVNO ZNOTRAJMOŽGANSKO KRVAVITEV SO:

- a) možganski gangliji
- b) možganski režnji
- c) mali možgani
- d) možgansko deblo
- e) hipofiza

a, c, d ???

13. TUMORJI ŽIVČNIH OVOJNIC SO:

- a) astrocitomi
- b) meningeom
- c) kraniofaringeom
- d) nevrofibrosarkom
- e) nevrinom

d, e

14. SIMPTOMI IN ZNAKI POVIŠANEGA ZNOTRAJ LOBANJSKEGA TLAKA SO:

- a) glavobol
- b) slabost, bruhanje
- c) hemipareza
- d) zastojna papila
- e) ataksija

a, b, d

15. NAJPOMEMBNEJŠE DG. METODE PRI MULTIPLI SKLEROZI:

- a) magnetna resonanca
- b) CT glave
- c) lumbalna punkcija
- d) EEG
- e) EMG

a, c

16. PARKINSONOVO BOLEZEN ZDRAVIMO Z:

- a) preparati L-dope
- b) antiepileptiki
- c) kortikosteroidi
- d) MAO-B inhibitorji
- e) dopaminsimi agonisti

a, e, (odgovor d ???)

17. PRI AMIOTROFIČNI LATERALNI SKLEROZI PRI KLINIČNEM PREGLEDU UGOTOVIMO:

- a) znake za prizadetost zgornjega motoričnega nevrona
- b) znake za prizadetost spodnjega motoričnega nevrona
- c) cereberalne znake
- d) senzibilitetne izpade
- e) parkinsonizem

→ **IN JO POTRDIMO Z:**

- f) CT glave
- g) EMG
- h) EEG
- i) magnetno resonanco
- j) evociranimi potenciali

a, b, g

18. ZA EPIDURALNO KRVAVITEV JE ZNAČILNO:

- a) nastane zaradi ruptуре srednje meningealne arterije
- b) kri se nabira med duro in arhnoideo
- c) lahko nastane "lucidni interval" (*kratek*)
- d) ugotovimo Hutchinsonovo zenico (*na isti strani kot epiduralni hematoma*)
- e) nastanejo kvalitativne motnje zavesti (*predvsem kantitativne*)

19. ZA SUBAKUTNO DEGENERACIJO HRBTENJAČE JE ZNAČILNO:

- a) nastane zaradi pomanjkanja vitamina B1
- b) okvarjeni so zadnji stebrički in piramidni progi
- c) nastane po op odstranitvi želodca
- d) zdravimo jo z vitaminom B12
- e) izmerimo znižane vrednosti vitamina B1 v serumu

b, c, d

20. PRI POLIRADIKULITUSU GULLIAIN-BARRE UGOTOVIMO:

- a) ascedentne proge
- b) albumino-citološko disociacijo
- c) patološki EEG (*običajno ne*)
- d) znižane prevodne hitrosti
- e) pleocitozo v likvorju (*ne, ↑ albumini, celice normalne!*)

→ **IN GA ZDRAVIMO Z:**

- f) humanimi imunoglobulini
- g) kortikosteroidi (*niso indicirani, razen pri rekurentnih*)
- h) plazmoferezo (*v hudih primerih tudi plazmofereza!!*)
- i) antiholinesterazami
- j) antiepileptiki

a, b, d, f

B - kar je dopisano v ležeči pisavi so komentarji

1. POD KVALITATIVNE MOTNJE ZAVESTI SPADAJO:

- a) somnolenca
- b) sopor
- c) delirij
- d) koma
- e) zamračenost

Pavilni odgovori so c, e

2. PRI APALIČNEM SINDROMU JE OKVARJEN DEL ŽIVČEVJA:

- a) možgansko deblo
- b) hemisferij velikih možganov
- c) hrbtenjača
- d) možganski živci
- e) spinalni živci

b

3. PRI PRETRESU MOŽGANOV LAHKO NASTANE:

- a) anterogradna amnezija
- b) demenca
- c) retrogradna amnezija
- d) amnestični sindrom
- e) oligofrenija

a, c, (odogovor d ???)

4. BITEMPORALNA HEMIANOpsija KAŽE NA OKVARO:

- a) vidnega živca
- b) optične hiazme
- c) optičnega traktusa
- d) optične radiacije
- e) primarne vidne skorje

b

5. HUTCHINSONOVO ZENICO JE ZNAČILNO:

- a) zenica je na eni strani razširjena
- b) zenica je na eni strani zožena
- c) zenica nima direktne reakcije na osvetlitev
- d) zenica nima indirektne reakcije na osvetlitev
- e) nasprotna zenica ima direktno in indirektno reakcijo na osvetlitev

→ IN NASTANE PRI OKVARI:

- f) n. abducensa
- g) n. trohlearisa
- h) n. okulomotoriusa
- i) n. oftalmikusa
- j) n. facialisa

a, c, d, h

6. PRI OKVARI N. ABDUCENSA NASTANE:

- a) divergentni strabizem
- b) konvergentni strabizem
- c) ptoza
- d) mioza
- e) diplpija

b

7. ZA OKVARO ZGORNJEGA MOTORIČNEGA NEVRONA JE ZNAČILNO:

- a) pareze
- b) povišanje mišičnega tonusa
- c) znak babinskega
- d) atrofija mišic
- e) živahni miotatični refleksi

a, b, c, e

8. PRI OKVARI DESNE CEREBRALNE(?? VERJETNO JE MIŠLJENO CEREBELARNE?!) HEMISFERE UGOTOVIMO:

- a) ataksija levih udov
- b) ataksija desnih udov
- c) senzibilitetne motnje po hemitipu na desni strani
- d) motnje ravnotežja pri hoji in stoji
- e) nistagmus

?????? a, b, d, e

9. RACAJOČA HOJA POMENI OKVAR:

- a) dorzifleksorjev obeh stopal
- b) glutealne mišične mase
- c) obeh peronealnih živcev
- d) piramidne poti
- e) bazalnih ganglijev

b

10. PRI MOTORIČNI AFAZIJI JE MOTENOČ

- a) razumevanje govora
- b) imenovanje
- c) fluentnost govora
- d) pisanje
- e) ponavljanje

b, c, d, e

11. MOŽGANSKO KAP UGOTOVIMO Z:

- a) kliničnim pregledom
- b) lumbalno punkcijo
- c) CT glave
- d) EEG (*v pomoč, ni značilen*)
- e) EMG

a, c

12. ZA SUBARAHNOIDNO KRVAVITEV SO ZNAČILNI NASLEDNJI ZNAKI IN SIMPTOMI:

- a) nenaden močan glavobol
- b) hemipareza
- c) znaki meningealnega draženja
- d) ataksija okončin
- e) motorična afazija

a, c

13. NEUROEPITELIJSKI MOŽGANSKI TUMORJI SO:

- a) astrocitomi
- b) oligodendrogliom
- c) kraniofaringeom
- d) glioblastom
- e) nevrinom

a, b, d

14. ZA KLINIČNO ZANESLJIVO OBLIKO MULTIPLE SKLEROZE MORAMO UGOTOVITI:

- a) en zagon
- b) dva zagona
- c) dve klinični žarišči
- d) eno klinično žarišče
- e) eno klinično in eno paraklinično žarišče

???? b, c, e ????

NOV McDONALDOW KRITERIJ --> KLINIČNO + MRI ŽARIŠČA

15. ZAGONE PRI MULTIPLI SKLEROZI ZDRAVIMO Z:

- a) citostatiki
- b) kortikosteroidi
- c) antiepileptiki
- d) miorelaksansi
- e) analgetiki

b

16. PRI PARKINSONOVI BOLEZNI UGOTOVIMO:

- a) tremor
- b) rigor
- c) diskinezije
- d) bradikinezijo
- e) dobro odzivnost na dopaminske agoniste

a, b, d, e

17. NAJPOGOSTEJŠA FOKALNA DISTONIJA JE:

- a) hemibalizem
- b) horea
- c) spazmodični toritkolis
- d) atetoza
- e) torzijska distonija

→ IN JO ZDRAVIMO Z:

- f) antiholinergiki
- g) z botulinovim toksinom
- h) nevroleptiki
- i) L-dopo
- j) tricikličnimi antidepressivi

c, f, g

18. ZGODNJE KOMPLIKACIJE KRANIOCEREBRALNIH POŠKODB SO:

- a) intrakranialni hematomi
- b) posttravmatska encefalopatija
- c) psevdotumor cerebri
- d) poškodbe možganskih živcev
- e) posttravmatska encefalopatija

a, d

19. ZA WILSONOVO BOLEZEN JE ZNAČILNO:

- a) da je dedna bolezen
- b) motena je presnova bakra
- c) okvarjeni so bazalni gangliji
- d) nastane zaradi pomanjkanja vitamina B12
- e) okvarjena so jetra
- f) Kayser-Fleischnerjev oborč

a, b, c, e, f

20. PRI MIASTENIJI GRAVIS UGOTOVIM:

- a) hitro utrujanje po mišičnem naporu
- b) senzibilitetne motnje
- c) piramidne znake
- d) pozitiven prostigminski test
- e) patološki EMG

a, d, e

C - kar je dopisano v ležeči pisavi so komentarji

1. PRI VKLENJENI ZAVESTI (LOCKED-IN SINDROM) SO OKVARJENE NASLEDNJE MOŽGANSKE STRUKTURE:

- a) Motorične proge v možganskem deblu
- b) Hemisferi velikih možganov
- c) Senzorične proge
- d) Hrbtenjača
- e) Mali možgani

Pravilni odgovori: a, c

2. OPTIČNA AGNOZIJA KAŽE NA OKVARO:

- a) Optičnega traktusa
- b) Aree parastiate in peristriate dominantne hemisfere
- c) Optičnega živca
- d) Optične radiacije
- e) Optične hiazme

b

3. ZA NISTAGMUS VELJA:

- a) So nehoteni ritmični gibi oči
- b) Pojavi se pri okvari ravnotežnega aparata
- c) Pojavi se pri akinetsko - rigidnem sindromu
- d) Pojavi se pri okvari piramidne proge
- e) Pojavi se pri okvari malih možganov

a, b, e

4. PRI CENTRALNI OKVARI PAREZI N. FACIALISA:

- a) Bolnike ne more nagubati čela in ima izravnane gube na čelu → *obratno*
- b) Bolnik ima povešen ustni kot, ki se pri gibih ne premika
- c) Slabše čuti polovico obraza
- d) Ima ojačan maseterski refleks
- e) Slabše okuša

→ OKVARJENA PA JE:

- f) Kortikospinalna proga
- g) N. facialis
- h) Kortikobulbarna proga
- i) Mali možgani
- j) n. Trigemini

b, odgovor e ??? , h

5. ZA FASCIKULACIJE VELJA:

- a) So hitre, nehotene kontrakcije ene motorične enote
- b) So hitre, nehotene kontrakcije enega mišičnega vlakna
- c) Se pojavijo pri okvari zgornjega motoričnega nevrona
- d) Se pojavijo pri okvari spodnjega motoričnega nevrona
- e) Spremlja jih atrofija mišic

a, d, e

6. ANOZOGNOZIJA JE:

- a) Je nesposobnost prepoznavanja predmetov
 - b) Je nesposobnost prepoznavanja obrazov
 - c) Je nesposobnost izvajanja večjih gibov
 - d) Je nesposobnost registriranja lastne pareze
 - e) Je nesposobnost govora
- IN NASTANE PRI OKVARI:**
- f) Desnega parietalnega režnja = *nedominantne hemisfere*
 - g) Levega čelnega režnja
 - h) Levega temporalnega režnja
 - i) Malih možganov

j) Primarnega vidnega korteksa

d, f

7. ZA PARKINSONOVO HOJO JE ZNAČILNO:

- a) Trup je nagnjen naprej, vsi sklepi na udih so lahko upognjeni
- b) Nastane pri okvari bazalnih ganglijev
- c) Koraki so kratki, drsajoči, brez spremljave rok
- d) Hoja je škarjasta
- e) Bolnikovo stopalo se med hojo poveša

a, b, c

8. MED GENERALIZIRANE EPILEPTIČNE NAPADE PRIŠTEVAMO:

- a) Tonočno - klonične napade tip grand mal
- b) motorične Jacksonove napade
- c) absence
- d) kompleksne žariščne napade
- e) senzorične Jacksonove napade

a, c

9. MED PRIMARNE GLAVOBOLE UVRŠČAMO

- a) Migreno
- b) Glavobol v rafalih
- c) Glavobol zaradi možganskega tumorja
- d) Glavobol tenzijskega tipa
- e) Glavobol ob subarahnoidni krvavitvi

a, b, d

10. ZA POLIMIOZITIS VELJA:

- a) Je dedna miopatija
- b) Je avtoimunska bolezen
- c) Predvsem so prizadete proksimalne mišične skupine
- d) Pri nevrološkem pregledu ugotovimo motnje sensorike
- e) V serumu so povišani mišični encimi

b, c, e

11. PRI POLINEVROPATIJ V NEVROLOŠKEM STATUSU UGOTOVIMO

- a) Motnje senzibilitete po tipu rokavu in nogavic
- b) Ugasle distalne miotatične reflekse (npr. Ahilov refleks)
- c) Piramidne znake
- d) Znake okvare malih možganov
- e) Težave pri hoji p oprstih in petah

→ VZROK ZA POLINEVROPATIJO PA JE LAHKO:

- f) Genetski
- g) Sladkorna bolezen
- h) Neoplazma
- i) Ledvična insuficienca ??? uremia - da
- j) Kronične infekcije

a, b, e, f, g, h, j, odgovor i ????

12. PRI OKVARI RADIALNEGA ŽIVCA UGOTOVIMO:

- a) Visečo roko
- b) Oslabelost ekstenzorjev zapestja in prstov
- c) Senzibilitetne motnje na palčevi strani dlani
- d) Senzibilitetne motnja po palčevi strani hrbtišča roke
- e) Krempljasto roko

a, b, c, d

13. ZA ALKOHOLNO ENCEFALOPATIJO (Wernicke-Korsakow) JE ZNAČILNO:

- a) Nastane zaradi pomanjkanja vitamina B1
- b) Nastane zaradi pomanjkanja vitamina B12
- c) V klinični sliki prevladujejo: ataksija, akcijski tremor, nistagmus, okvare n. Anducensa
- d) Zdravimo jo z Apaurinom
- e) Zdravimo jo z vitaminom B1

a, c, e

14. V CEREBROSPINALNEM LIKVORJU PRI TBC MENINGITISU UGOTOVIMO

- a) Limfocitno pleocitozo
- b) Povečane koncentracije glukoze
- c) Znižane koncentracije glukoze
- d) Povišane beljakovine
- e) Bacile tuberkuloze

a, c, d, e

15. ZA MB ALZHEIMER VELJA:

- a) Je progresivna demenca
- b) Je dedna bolezen
- c) CT glave pokaže možgansko atrofijo
- d) Lahko jo zdravimo z inhibitorji acetilholinesteraze
- e) Nastane zaradi pomanjkanja vitamina B12

a, b, c, d

16. REDKEJŠE DEMIELINIZACIJSKE BOLEZNI SO:

- a) Parkinsonova bolezen
- b) Akutni disemirani encefalomyelitis = *ADEM*
- c) Multipla skleroza
- d) Akutni hemoragični encefalomyelitis
- e) Creutzfeld-jakobova bolezen

b, d

17. NAJBOLJ POGOSTE MOŽGANSKE METASTAZE SO:

- a) Karcinom prostate
- b) Karcinom dojke
- c) Karcinom bronha
- d) Hipernefrom
- e) Karcinom glave in zatilja

b, c, d

18. ISHEMIČNO MOŽGANSKO KAP LAHKO ZDRAVIMO Z:

- a) Trombolizo
- b) Antiagregacijskimi zdravili
- c) Antiepileptiki
- d) Beta interferonom
- e) Tricikličnimi antidepresivi

a, b

19. PRI ISHEMIJI MOŽGANSKEGA DEBLA UGOTOVIMO:

- a) Motnje koordinacije udov
- b) Okvaro možganskih živcev
- c) Znake piramidne okvare
- d) Znake okvare spinotalamične proge
- e) Aprakcijo

a, b, c, d

20. ZA PSEVDOTUMOR MOŽGANOV (BENIGNA INTRAKRANIALNA HIPERTENZIJA) VELJA:

- a) Ugotovimo znake povišanega intrakranialnega tlaka

- b) Ugotovimo okvaro piramidne proge
- c) Ugotovimo okvaro malih možganov
- d) Pri lumbalni punkciji ugotovimo povišan krvni tlak
- e) CT glave pokaže možganski tumor *NE, pri psevdotumorju ni tumorja!*

a

D - kar je dopisano v ležeči pisavi so komentarji

1. KVANTITATIVNE MOTNJE ZAVESTI SO:

- a) Somnolenca
- b) Zamračenost
- c) Sopor
- d) Delirantno skaljena zavest
- e) Koma

a, c, e

2. OKVARA OPTIČNE HIAZME POVZROČI

- a) Kontralateralno homonimno hemianopsijo
- b) Bitemporalno hemianopsijo
- c) Nazalni izpad vidnega polja
- d) Optično agnozijo

b

3. ZA BULBARNO PARALIZO JE ZNAČILNO:

- a) Dizartrija
- b) Disfagija
- c) Homonimna hemianopsija
- d) Atrofija in fascikulacije jezika
- e) Okvara n. facialis po centralnem tipu

a, b

4. HOREATIČNI ZGIBKI SO:

- a) Hitre nehotene kontrakcije mišičnih vlaken, ki pripadajo eni motorični enoti
- b) Sunkoviti, neritmični, asinhroni zgibki udov in telesa
- c) Močne kontrakcije mišic trupa in vratu
- d) Ritmični gibi delov telesa

b

5. ZA OKVARO ZGORNJEGA MOTORIČNEGA NEVRONA JE ZNAČILNO:

- a) Izguba mišične moči z atrofijami in fascikulacijami
- b) Znižanje mišičnega tonusa
- c) Ojačani miotatični refleksi
- d) Pojav patoloških refleksov

c, d

6. ZNAK BABINSKEGA JE:

- a) Plantarni odziv v fleksiji
- b) Plantarni odziv v ekstenziji
- c) Ni plantarnega odziva
- d) Refleks prijemanja

b

7. PRI CEREBELARNI OKVARI SE POJAVI

- a) Ataksija hoje
- b) Cerebelarni tremor
- c) Pareza
- d) Disdiadohagineza

a, b, d

8. ZA TALAMIČNI SINDROM JE ZNAČILNO:

- a) Hipalgezija
- b) Hiperpatija
- c) Disocirano motnjo senzibilitete

d) Izguba vseh senzoričnih kvalitiet

b, odgovor d ???

9. PRI OKVARAH SOMATOSENZORIČNEGA DELA MOŽGANSKE SKORJE UGOTAVLJAMO

- a) Nesposobnost lokalizacije dražljaja
- b) Okvaro pozornosti za dražljaje
- c) Nesposobnost razlikovanja dvojnega dražljaja
- d) Nesposobnost spoznavanja predmetov s tipom
- e) Spontane bolečine

a, b, d, odgovor c ???

10. ZA BROCOVO AFAZIJO JE ZNAČILNO:

- a) Nesposobnost izgovorjave
- b) Govor je netekoč
- c) Razumevanje govora je moteno
- d) Spremlja ga hemipareza po desni in homonimna hemianopsija

b, d

11. CEREBROVASKULARNI INSULT JE:

- a) Motnja v delovanju centralnega živčnega sistema zaradi bolezni ekstrakranialnega in intrakranialnega cerebralnega žilja
- b) Lahko posledica ishemije centralnega živčnega sistema
- c) Lahko posledica krvavitve v centralni živčni sistem
- d) Lahko posledica ishemije perifernega živčnega sistema

a, c

12. DEMENCA SE LAHKO RAZVIJE PRI:

- a) Difuzni možganski aterosklerozi
- b) Normotenzivnem hidrocefalusu
- c) Funikularni mielozii
- d) Degenerativnem obolenju možganov (Alzheimerjeva bolezen)

a, b, d

13. TUMOR MOŽGANSKIH OVOJNIC JE:

- a) Meningeom
- b) Primarni melanomski tumor
- c) Nevrinom
- d) Glioblastom

a, b

14. PRI KLINIČNO ZANESLJIVI OBLIKI MULTIPLE SKLEROZE UGOTOVIMO:

- a) Dva zagona
- b) Dve žarišči (2 klinični ali eno klinično in eno paraklinično)
- c) En zagon
- d) Pozitivne oligoklonalne IgG trakove v likvorju

a, b, d

15. ZA PARKINSONOVO BOLEZEN SO ZNAČILNI:

- a) Hemipareza
- b) Rigor
- c) Tremor
- d) Senzibilitetne motnje
- e) Bradikineza

b, c, e

16. ZA AMIOTROFIČNO LATERALNO SKLEROZO (ALS) VELJA:

- a) Ni senzibilitetnih izpadov

- b) Lahko so prizadeti možganski živci - *ne*, čeprav motorični del je
- c) Je napredujopča degenerativna bolezen
- d) Okvarjena sta zgornji in spodnji motorični nevron

a, c, d

17. ZA MOŽGANSKI PRETRES VELJA

- a) Je reverzibilna motnja možganske funkcije
- b) Je odprta poškodba možganov
- c) Spremlja ga lahko retrogradna ali anterogradna amnezija
- d) Izguba zavesti traja več ur
- e) Izguba zavesti traja nekaj minut

a, c, e

18. ZA OKVARO RADIALNEGA ŽIVCA JE ZNAČILNO:

- a) Pri visoki okvari ni mogoče iztegniti komolca, zapestja in prstov
- b) Motnje senzibilitete nastanejo na radialni strani zapestja
- c) Za lezijo na podlahti je značilna pareza iztegovalk prstov in palca brez okvare senzibilnosti
- d) Je pogosto prizadet pri zastrupitvi s svincem

a, c, odgovor d ???

19. ZA POLINEVROPATIJO JE ZNAČILNO:

- a) Simetrični senzibilitetni izpadi na distalnih delih okončin
- b) Distalni miotatični refleksi so ugasli
- c) Vzrok je kompresija spinalne korenine
- d) Pogost vzrok je sladkorna bolezen

a, b, d

20. ZA MIASTENIJO GRAVIS JE ZNAČILNO

- a) Hitra utrudljivost ob mišičnem naporu
- b) Obsežni senzibilitetni izpadi
- c) Pozitivni tenzilonski test
- d) Lahko jo spremlja timom

a, c, d