

## PISNI IZPIT IZ PEDIATRIJE

(S krepkim tiskom so označeni pravilni odgovori!)

Prekrižaj (1) pravilni odgovor. Pravilni odgovor šteje 1 točko, napačni -1 točko, brez odgovora 0 točk.

1. Otrok pridobi v 1. letu življenja:

- 4 kg
- 7 kg**
- 11 kg

2. Odkrivanje kongenitalne hipotireoze v Sloveniji s presejalnim testom se izvaja:

- Ob rojstvu**
- Po 30 dneh
- Po 10 dneh

3. Kontraindikacija za dojenje je:

- Infekt matere
- Infekt otroka
- Volčje žrelo otroka**

4. Znak rahitisa je:

- Makroglosija
- Sedlast nos
- Kraniotabes**

5. V starosti 12 mesecev se izvaja vakcinacija naslednjih bolezn:

- Morbili**
- Rubella**
- Variola

6. Za fenilketonurijo **ni** značilno:

- Vonj po miših
- Obstipacija**
- Hipopigmentacija

7. Za kongenitalno adrenalno hiperplazijo je značilno:

- Povečani testisi
- Urogenitalni sinus**
- Mikropenis

8. Sladkorna bolezen pri otrocih je najpogostejša:

- V predšolskem obdobju
- V puberteti**
- Pri dojenčkih

9. Za hipotalamično okvaro **ni** značilno:

- Insomnija

- Hipotenzija**
  - Diabetes insipidus
10. Zaplet revmatoidnega artritisa je:
- Glavkom**
  - Chorea
  - Srčna dekompenzacija
11. Za alergični vaskulitis **ni** značilno:
- Krvavitve v koži
  - Luščenje kože**
  - Abdominalne kolike
12. Hemolitična bolezen novorojenčka je posledica:
- Rh inkopatibilnosti**
  - Neonatalne sepse
  - Listerioze
13. Pri zdravljenju limfoblastne levkemije je potrebno obsevanje:
- Centralnega živčevja**
  - Dolgih kosti
  - Vranice
14. Za Wilmsov tumor je značilno vse razen:
- Pojavljanje v predšolskem obdobju
  - Hemihipertrofija telesa
  - Rezistenca na zdravljenje**
15. Znak astme pri otroku **ni**:
- Podaljšan ekspirij
  - Ugrezanje prsnega koša
  - Laringospazem**
16. Za koarktacijo aorte je značilno:
- Cianoza
  - Odsotnost pulzov na nogah**
  - Počepanje otroka
17. Za hipertrofično stenozo pilorusa je značilno bruhanje:
- 1. mesec življenja**
  - Po 6. mesecu
  - Po 1. letu
18. Za malabsorbcijo je značilno:
- Avitainoza**
  - Obstipacija
  - Aholično blato

19. Mucoviscidozo diagnosticiramo z analizo naslednjih elektrolitov v znoju:

- Fosfatov
- Kalcija
- Kloridov**

20. Bruhanje mleka takoj po rojstvu je znak:

- Traheozofagealne fistule
- Atrezije požiralnika**
- Pilorostenoze

21. Obstruktivsko uropatijo povzročajo:

- Aberantne žile**
- Nefronoftiza
- Ektopija sečnega mehurja

22. Za hondrodistrofijo je značilno:

- Nenormalna rast ekstremitet
- Normalna rast trupa**
- Duševna slaboumnost

23. Za prekinitev vročinskih krčev **ni** primerna aplikacija diazepama:

- Rektalno
- Intravenozno
- Per os**

24. Za osteogenezo imperfecto je značilno vse razen:

- Zelo lomljivih kosti
- Anemije**
- Naglušnosti

25. Osteomyelitis zdravimo:

- S penicilinom
- S kloksacilinom**
- Z gentamicinom

## PISNI IZPIT IZ PEDIATRIJE

**(S krepkim tiskom so označeni pravilni odgovori!)**

Prekrižaj (1) pravilni odgovor. Pravilni odgovor šteje 1 točko, napačni -1 točko, brez odgovora 0 točk.

1. Pri novorojenčkih v Sloveniji je najpogostejši vzrok smrtности:

- Sepsa
- Prirojene anomalije**
- Mekonijski ileus

2. Velika mečava na lobanji se ne zaraste pri 2 letih pri:

- Hondrodistrofiji
- Kraniostenozii
- Rahitisu**

3. Najprimernejše prehranjevanje nedonošenčka s težo 1300 gr je:

- Dojenje
- Totalna parenteralna prehrana
- Prehrana s sondo**

4. Kontraindikacija za dojenje **ni**:

- Ragada dojk**
- Duševna bolezen matere
- Prematurnost

5. Pri malabsorpciji se **ne** pojavlja hipovitaminoza:

- D
- K
- C**

6. Za Turnerjev sindrom **ni** značilno:

- Edem stopal
- Starost matere nad 40 let**
- Ščitast prsni koš

7. Za konstitucionalno nizko rast je značilna:

- Retardirana kostna starost**
- Normalna kostna starost
- Asinhronost dozorevanja kosti

8. Pri mobilnih testisih obstaja nevarnost:

- Neplodnosti
- Malignoma**

- Ni večjih problemov**
9. Analiza hemoglobina A1c omogoča oceno:
- Saturacije s kisikom
  - Intoksikacije s plini
  - Povprečne glikemije pri diabetesu**
10. Za protin so značilni:
- Podkožni vozlički
  - Kožni eritem
  - Tofi**
11. Za revmatoidni artritis je značilno:
- Visoka sedimentacija**
  - Trombocitoza
  - Predhodno prebolela angina
12. Sideropenična anemija se redko pojavlja pri:
- Dojenčkim
  - Predšolskim otrocih
  - Adolescentih**
13. Trombocitopenija pri otrocih se **ne** pojavlja:
- Pri virusnem infektu
  - Pri levkozi
  - Pri Kawasakijski bolezni**
14. Non Hodkinov limfom pri otrocih ima:
- Dobro prognozo
  - Ni ozdravljiv
  - Ob optimalni terapiji preživi 50% otrok po 5 letih**
15. Za bronhiektazije je značilno vse razen:
- Kašlja
  - Sluzavega, gnojnega izcedka
  - Potenja**
16. Astmo pri otroku zdravimo z:
- Inhalacijami salbutamola – Ventolin**
  - Efedrinom per os
  - Infuzijami aminofilina
17. Sinusna aritmija je znak:
- Okvare miokarda
  - Hiperkaliemije
  - Normalne akcije srca**
18. Za ileus **ni** značilno:

- Odsotna peristaltika
  - Bruhanje
  - Diareja**
19. Za celiakijo **ni** značilno:
- Hipovitaminoze
  - Atrofija črevesnih resic
  - Bruhanje**
20. Chronove bolezni pri otroku ne zdravimo:
- S sulfasalazinom
  - Z amoksiklavom**
  - S steroidi
21. Sanford **ni** pozitiven, kadar je v 1 ml urina:
- 1000 000 klic
  - 10 000 klic**
  - 100 000 klic
22. Komplikacija akutnega glomerulonefritisa je lahko:
- Akutna srčna odpoved**
  - Sinusna aritmija
  - Akutna hipotenzija
23. Za infantilne spazme je značilno:
- Slaba prognoza**
  - Po 4. letu prenehajo
  - Pojavijo se pri telesni temperaturi nad 39°C
24. Za tuberozno sklerozo **ni** značilno:
- Pojav tumorjev
  - Adenoma sebaceum
  - Nevrofibromi**
25. Konvulzije pri otroku prekinemo z naslednjo dozo diazepama:
- 0,3 mg/kg t.t.**
  - 3 mg/kg t.t.
  - 30 mg/kg t.t.