

BOLEZNI SPOLOVIL

BOLEZNI MOŠKIH SPOLOVIL:

***FIMOZA**, pogoste cirkumcizije

***INGVINALNA RETENCIJA TESTISA-KRIPTORHIZEM** pomeni retenco testisov, je razvojna anomalija, pojavi se seminom, ki lahko mestastazira. Moški lahko nima enega testisa ali obeh.

***PARAFIMOZA** nastane pri prekinitvi cirkulacije krvi

***HIDROKELA**-v mreni se nabere tekočina

***INGVINALNA HERNIA**-s seboj potegne črevo

***HIPOSPADIJA** – uretra se konča spodaj in ne v glansu penisa

***EPISPADIJA** – uretra se konča zgoraj in ne v glansu penisa. Testisa nastaneta v skrotumu, testisi se morao op.urediti najkasneje do 2 let v skrotum

BOLEZNI ŽENSKIH SPOLOVIL

***VULVOVAGINITIS** - vnetje spolovila, rdečina, izcedek, povzročajo bakt., virusi, glive, je boleče, povezano s tujkom v spolovilu, povzročajo bakterije ali glivice, tujek v vagini. Krvavitve najpogosteje povezane s tujkom v spolovilu, vsaka krvavitev pri otroku-znak mogočega malignega obolenja.