

Izpit iz dne 4. 6. 2008 iz predmeta travmatologija

1. Nezavesten poškodovanec ima dve uri po poškodovanju RR 70/40 frekenco pulza 140/min, Ht 0,39. Potrebuje takoj:

- A. HES 500 ml
- B. 0,9 NaCl 1000ml
- C. Adrenalin
- D. Transfuzijo krvi 500ml
- E. Nobenim od teh

2. Katera preiskava ne spada med osnovno mrežo slikovnih preiskav pri politravmatizmu:

- A. Rtg glave
- B. Rtg medenice
- C. Rtg trebuha na levem boku
- D. Rtg prsnega koša
- E. Aortografija

3. Pri politravmatiziranem se ukvarjajo najprej le s poškodbami, ki ogrožajo poškodovančovo življenje. Kasneje moramo ugotoviti vse, tudi najmanjše poškodbe.

- A. Prva trditev je pravilna, druga je napačna
- B. Prva in druga trditve sta pravilni in vzročno povezani
- C. Prva in druga trditve sta pravilni in nista vzročno povezani
- D. Prva trditev je napačna, druga je pravilna
- E. Prva in druga trditve sta napačni

4. Kompliciran zlom pomeni, da je nad zlomom rana kože. Subperiostalni zlom pomeni, da je kost cela, prekinjen pa je le zadebeljen perióst.

- A. Prva trditev je pravilna, druga je napačna
- B. Prva in druga trditve sta pravilni in vzročno povezani
- C. Prva in druga trditve sta pravilni in nista vzročno povezani
- D. Prva trditev je napačna, druga je pravilna
- E. Prva in druga trditve sta napačni

5. Za hitro rast kalusa je najbolj pomemben dejavnik:

- A. Visoka koncentracija kalcija v krvi
- B. Povsem rigidna imobilizacija
- C. Dednost
- D. Ohranjena žilna mreža v predelu ob zlozu
- E. Dednost

6. Najmanj poškoduje žilje naslednja osteosinteza:

- A. S ploščico
- B. Intramedularna z brušenjem medularnega kanala
- C. Intramedularna osteosinteza na zaklep
- D. Z dvema ploščama
- E. S ploščo in posameznimi vijaki

7. Pri pseudosrtrozi je motnja pri oblikovanju:

- A. Fibroznega kalusa
- B. Kolagene mreže
- C. Hrstančnega kalusa
- D. Kostnega kalusa
- E. Ničesar od tega

8. Notranja imobilizacija ni:

- A. Osteosinteza z žicami na priteg
- B. Osteosinteza z ploščico
- C. Osteosinteza z zunanji fiksatere
- D. Osteosinteza z vijaki
- E. Intramedularna osteosinteza

9. Funkcionalno zdravljenje zlomov pomeni takšno zdravljenje, da ni imobiliziran noben sklep. Na funkcionalni način lahko zdravimo vse zlome v telesu.

- A. Prva trditev je pravilna, druga je napačna
- B. Prva in druga trditve sta pravilni in vzročno povezani
- C. Prva in druga trditve sta pravilni in nista vzročno

povezani

- D. Prva trditev je napačna, druga je pravilna
- E. Prva in druga trditve sta napačni

10. Do zastrupitve z CO pride, ker:

- A. Se veže na alveolarne celice v pljučih
- B. Se veže na mišične celice v srcu
- C. Se veže na živčne celice
- D. Se veže na levkocite
- E. Se veže na eritrocite

11. Zastrupitev z alkoholom se lahko konča s smrtjo, izjemoma pri ljudeh, ki alkohola niso vajeni.

- A. Prva trditev je pravilna, druga je napačna
- B. Prva in druga trditve sta pravilni in vzročno povezani
- C. Prva in druga trditve sta pravilni in nista vzročno povezani
- D. Prva trditev je napačna, druga je pravilna
- E. Prva in druga trditve sta napačni

12. Pravilni ukrep pri pijanem do nezavesti je:

- A. Damo mu močno črno kavo
- B. Izzovemo bruhanje
- C. Damo mu pomirjevalo
- D. Položimo ga v položaj za nezavestnega
- E. Pije naj veliki vode

13. Okvara jeter in ledvic nastane pri zastrupitvi z:

- A. Vražji goban
- B. Zelena mušnica
- C. Panterjeva mušnica
- D. Rdeča mušnica
- E. Volčja češnja

14. Omedlevica je najpogostejša in najmildejša oblika kratke nezavesti. Vzrok zanjo je vedno bolezenski.

- A. Prva trditev je pravilna, druga je napačna
- B. Prva in druga trditve sta pravilni in vzročno povezani
- C. Prva in druga trditve sta pravilni in nista vzročno povezani
- D. Prva trditev je napačna, druga je pravilna
- E. Prva in druga trditve sta napačni

15. Kratkotrajna nezavest je znak pretresa možganov, dolgotrajna ali ponovna nezavest je znak hujše poškodbe možganov.

- A. Prva trditev je pravilna, druga je napačna
- B. Prva in druga trditve sta pravilni in vzročno povezani
- C. Prva in druga trditve sta pravilni in nista vzročno povezani
- D. Prva trditev je napačna, druga je pravilna
- E. Prva in druga trditve sta napačni

16. Pravilni ukrep pri histeričnem napadu je:

- A. Odstrani opazovalce
- B. Med zobe vtakni kak predmet
- C. Tableta apaurina
- D. Iztegovanje palcev
- E. Čvrsto privezovanje k trdnemu predmetu

17. Življenjsko ogroženi niso tisti, ki:

- A. Krvave iz velike arterije
- B. So v globoki nezavesti
- C. Ki se dušijo
- D. Ki imajo drisko
- E. Ki jim grozi zastoj srca

18. Med triažo dajemo neodložljivo prvo pomoč. Obenem skušamo čim več poškodovancev dokončno oskrbeti.

- A. Prva trditev je pravilna, druga je napačna

- B. Prva in druga trditve sta pravilni in vzročno povezani
- C. Prva in druga trditve sta pravilni in nista vzročno povezani
- D. Prva trditev je napačna, druga je pravilna
- E. Prva in druga trditve sta napačni

19. Poškodovance moramo čim hitreje odstraniti z mesta nevarnosti. Oživiljati jih začnemo po prenosu na varno mesto.

- A. Prva trditev je pravilna, druga je napačna
- B. Prva in druga trditve sta pravilni in vzročno povezani
- C. Prva in druga trditve sta pravilni in nista vzročno povezani
- D. Prva trditev je napačna, druga je pravilna
- E. Prva in druga trditve sta napačni

20. Pri dvigovanju in prenašanju poškodovanca ne upoštevamo:

- A. Vrsto poškodbe
- B. Splošno stanje poškodovanca
- C. Števila reševalcev
- D. Razdaljo prenašanja
- E. Zahteve svojcev poškodovanca

21. Pri katerem stanju ni nujno nositi poškodovanca z glavo navzdol:

- A. Izkrvavitvi
- B. Krvavitvi iz ust
- C. Pnevotoraksu
- D. Bruhanju
- E. Nezavestem, krvavečem iz nosu

22. Ena od naštetih nalog ni obvezna za spremljevalca v rešilnem avtomobilu.

- A. Nadzirati položaj poškodovanca
- B. Opazovati spremembo zavesti
- C. Nadzirati barvo kože, ustnic in ušes
- D. Nadzirati obvezo
- E. Iskati najkrajšo pot do bolnišnice

23. Z osebnim avtomobilom smemo prepeljati poškodovanca z edino poškodbo:

- A. Glave
- B. Hrbtenice
- C. Zlom podlehiti
- D. Zlom goleni
- E. Zlom stegnenice

24. V torbici za prvo pomoč ni:

- A. Škarje
- B. Svinčnik
- C. 10 prvih povojev
- D. Cramerjeve opornice velikosti 10 cm x 60 cm
- E. Maska za izvajanje umetnega dihanja

25. V anamnezi nepolitratvmatiziranega poškodovanca ni potrebno posebej spraševati o:

- A. Podatek o otroških boleznih
- B. Čas poškodovanja
- C. Način poškodovanja
- D. Sedanjem jemanju zdravil
- E. Prejšnjih poškodbah na tem mestu

26. Najpomembnejši del operacije sveže travmatike rane, kar zadeva preprečevanja vnetja, je:

- A. Način zapiranja rane
- B. Čiščenje okolice rane
- C. Razkuževanje oklice rane
- D. Ekscizija robov rane
- E. Pokrivanje zaprte rane

27. Najpomembnejši del operacije kroničnega osteitisa je

- A. Drenaža
- B. Nekrektomija**
- C. Izpiranje
- D. Način zapiranja rane (šivanje po slojih)
- E. Priklop prostega režnja

28. Globino šoka najbolj zanesljivo kaže

- A. pH venozne krvi
- B. pH arterielne krvi
- C. arterijski tlak
- D. koncentracija laktata**
- E. saturacija kisika v krvi

29. Katera trditev ni značilnost poškodovanja v vojnih operacijah

- A. povečano število poškodovancev je pričakovano in celo načrtovano
- B. poškodovanci so izbrani: istega spola, starosti, fizične kondicije
- C. pričakujemo izključno strelne poškodbe**
- D. poškodbe so podobne
- E. pogoji za zdravljenje se hitro spreminjajo

30. V svetovnem merilu so poplave najpogostejša naravna nesreča. Skoraj 90% smrti v naravnih nesrečah je vzročno povezanih z poplavami.

- A. Prva trditev je pravilna, druga je napačna**
- B. Prva in druga trditev sta pravilni in vzročno povezani
- C. Prva in druga trditev sta pravilni in nista vzročno povezani
- D. Prva trditev je napačna, druga je pravilna
- E. Prva in druga trditev sta napačni