

## TEST IZ INTERNE MEDICINE

### **1. ZNAKI REVMA TIČNE VROČINE SO:**

- Visoka vročina, znojenje
- Na srcu so vidni znaki vnetja (PANKARDITIS)
- Revmatična bolečina (boleči ali otekli sklepi)
- Vnetje endokarda, miokarda in perikarda

### **2. PRI RESPIRACIJSKI ACIDOZI JE:**

- pH zmanjšan
- Koncentracija CO<sub>2</sub> zvečana
- Koncentracija HCO<sub>3</sub> normalna
- Pri motnjah funkcije pljuč

### **3. KOMPLIKACIJE AMI:**

- Srčna insuficienca
- Kardiogeni šok
- Arterijska hipertenzija
- Ruptura srca (redka komplikacija)
- Motnje srčnega ritma (aritmije)

### **4. ZNAKI SEPTIČNEGA ŠOKA:**

- Hladna in znojna koža
- Cianoza sluznic (ustnic)
- Tahikardija (povečan pulz)
- Huda hipotenzija
- Velika splošna slabost (nauzia)

### **5. BOLNIKI S KRONIČNO OBSTRUKTIVNO PLJUČNO BOLEZNIJO (KOPB)**

- Menjava plinov ni normalna, prevelik delež CO<sub>2</sub> v arterijski krvi (hiperkapnija)
- Hipoksemija arterijske krvi

### **6. ZAPLETI PEPTIČNE RAZJEDE ŽELODCA:**

- Povzroči lahko rupturo arterije, kar povzroči krvavitev
- Bruhanje krvi
- Melena (akutna krvavitev v blatu)
- Perforacija želodčne stene
- Obstipacija
- Penetracija (prodiranje čira v sosednje organe)
- Stenoza pilorusa

### **7. UKREPI PRVE POMOČI ZASTRUPLJENCA:**

POTEKA V 3 FAZAH:

- odstranimo strup
- nevtralizacija strupa
- nadaljujemo simptomatsko terapijo

### **8. POPUŠČANJE SRCA NAJPOGOSTEJE POSLABŠAJO:**

- Kronična obolenja
- Nosečnost
- Aritmije
- Vnetni procesi na srčni mišici (infekcije)
- Okvare zaklopk
- Anemije

9. **PRI KRONIČNEM PLJUČNEM SRCU SO ZNAKI BOLEZNI POSLEDICA HIPERTROFIJE IN KASNEJE POPUŠČANJE:**

- Desnega prekata pri bolezni pljučnega parenhima
  - Značilen je kronično povečan RR (preobremenjeni desni prekat)
- KRONIČNO PLJUČNO SRCE JE POSLEDICA OBOLENJA PLJUČ

10. **AGRANULOCITOZA JE BOLEZENSKO STANJE, PRI KATEREM JE MOČNO ZMANJŠANO ŠTEVILO granulocitov V PERIFERNI KRVI NAJPOGOSTEJŠI VZROK ZANJO JE PREOČUTLJIVOST NA zdravila, kemikalije**

11. **KAJ JE PLEURITIS**

- Je vnetje pleure ali rebrne mreže
- VRSTE: suh in eksudativni pleuritis
- ZNAKI: kašelj in zbadajoča bolečina v prsnem košu
- DIAGNOZA: RTG p.c  
: torakalna p?

12. **NAJPOGOSTEJŠI ZNAKI AKUTNEGA VNETJA GLOMERULONEFRITISA:**

- SPOŠNI ZNAKI: utrujenost, glavobol, slabost, bolečine v ledjih, otekle veke, zabuhel obraz, zmanjšana diureza (oligurija),
- KLINIČNI ZNAKI: oligurija, arterijska hipertenzija, edem

13. **O ARTERIJSKI HIPERTENZIJI GOVORIMO, KADAR IMA BOLNIK:**

- Stalno zvečan RR nad 140/90
- Okvare nastanejo predvsem na malih arterijah
- Pri nastanku so pomembni mnogi r22222222222222222222i dedna dispozicija
- LAHKO JE: PRIMARNA- ne poznamo vzroka  
: SEKUNDARNA- je posledica sistemskega obolenja

Arterijska hipertenzija ima lahko benignen (blag) potek ali zločistega (hitrega) oz. maligna.  
TH:jemanje zdravil je doživljensko

14. **PRI SINDROMU DISEMINIRANE INTRAVASKULARNE KOAGULACIJE (DIK)**

- Značilne so tromboze na področju malih žil
- Nastane lahko po: OBSEŽNIH OPEKLINAH, JETRNI BOLEZNI, EKLAMPSIJI
- Dg: zmanjšano število TROMBOCITOC, zmanjšano število KONCENTRIRANEGA FIBRINOGENA
- Th: vročina, majhni odmerki heparina

15. **PRI NAPREDOVALNEM DIFUZNEM PLAZMOCITOMU POGOSTO ZASLEDIMO:**

- Razrast plazmatk v pljučnem tkivu, zasledimo pa pospešeno sedimentacijo in anemičnost

16. **ZNAKI HIPOTIROZE SO:**

- Pomanjkanje tiroksina
- Bradikardija
- Hipotenzija
- Podhlajenost
- Hipoventilacija
- Bleda, vlažna koža

17. **KATERI OD ZNAKOV SO ZNAČILNI ZA HIPOGLIKEMIJO:**

- Tahikardija
- Nemir in drget
- Znojenje
- Utrujenost

- Lakota ( če je lažja oblika)
- Slabost mišičja
- Če pade v nezavest ima krče podobne epileptičnim – koma- smrt

### **18. KATERI OD ZNAKOV SO ZNAČILNI ZA HIPERGLIKEMIJO:**

- Topla vlažna koža
- Glukoza v urinu
- Zadah po acetonu
- Povečano izločanje urina
- Žeja

### **19. ZA SISTEMSKIM LUPUSOM ERITEMATOZUSOM ZBOLEVAJO:**

- Predvsem mlajše ženske
- Obolenje se kaže na koži in sluznicah
- Ženske so visoko febrilne, anemične

### **20. ADDISONOVA BOLEZEN – ZMANJŠAN KORTIZOL:**

- Je ime za primarno insuficienco LEDVIČNE SKORJE
- ZNAKI: utrujenost, zmanjšan apetit – hujšanje, nespečnost, bolečine v trebuhu, bruhanje, poudarjena pigmentacija kože, zmanjšan RR
- Th: nadomeščamo manjkajoči KORTIZON

### **21. HEMEROIDI:**

- Razširjene vene v predelu anusa ali pa segajo tudi globje v rektum
- Odvisni so od načina prehranjevanja, dedne dispozicije, od poklica (sedeče delo)
- Diagnostika: REKTALNI PREGLED- FIZIKALNI PREGLED, anamneza
- TH: način prehranjevanja, medikamentoza, operativno

### **22. JETRNA CIROZA:**

- Je kronična difuzna bolezen jeter
- VZROKI: alkoholizem, sinusna okužba, zdravila, ki so hepatotoksična, kardialna
- SIMPTOMI: krvavitve, motnje CŽS, insuficienca jeter, icterus (zlatenica), edem, ascites (nabiranje tekočine v trebuhu), inapetenca, hujšanje, samo trebuh raste
- PONEKROZNA CIROZA- vzrok je hepatitis
- BILARNA CIROZA- obstrukcija žolča
- KARDIALNA CIROZA – srčna insuficienca, zastajanje krvi v venah

### **23. ZNAKI MIOKARDNEGA INFARKTA:**

- Nenadna bolečina za prsnico, ki ima značilen potek
- Značilno da po aplikaciji NITROGLIANINA bolečina izgine
- Zamašena koronarna arterija (področje nekrotizira – ostane brazgotina, ki pa moti normalno delovanje srca, povečana vrednost encimov v krvi)
- Povečan RR, tahikardija, aritmija, bolnik je smrtno prestrašen, povečan SR, povečana TEMPERATURA, pospešena dejavnost encimov v krvi

### **24. PLJUČNI EMFIZEM:**

- VZROK – ponavadi je vzrok kajenje, cigaretni dim, kronični bronhitis, kronične fibrozne bolezni pljuč
- SIMPTOMI: dolgotrajen kašelj
- Bolezen poteka potuhnjeno, pljučni mešički so razširjeni in napihnjeni
- Značilen je INSPIRATORNI STRIDOR

### **25. ATELEKTOZA PLJUČ:**

- Je zgriznjenje dela pljuč, običajno nastane na tem mestu pljučnica (žarišče)
- V tem delu je malo ali nič zraka
- VZROK: različen
  - KOMPRESIJSKA ATELEKTAZA (tumor, stisne pljuča)

- OBSTRUKCIJSKA ATELEKTAZA ( tujek fibrozni eksudat)
- ZNAKI: dispnoa, cianoza

26. **POLICITEMIJA** – povečan volumen trombocitov  
**POLIHEMIGLOBINEMIJA** – povečan volumen eritrocitov

**27. AGRANULOCITOZA:**

- Značilna je angina, ki se pogosto ponavlja (znak)
- Močno zmanjšano število granulocitov v periferni krvi

**28. ZASTRUPITEV Z METILNIM ALKOHOLOM:**

- ZNAKI: ima omotico,
  - : glavobol,
  - : sili ga na bljuvanje,
  - : ima bolečine v trebuhu,
  - : pride lahko do šoka,
  - : cianoza, krči, koma, smrt

**29. MIOKARDIOPATIJA**

- Je izolirana kronična degenerativna bolezen srčne mišice
  - ZNAČILNOSTI: hipertrofija miokarda,
    - : degenerativne spremembe mišičnih vlaken,
    - : limfoplazmatska infiltracija
  - RAZDELIMO JIH GLEDE NA FUNKCIJSKE MOTNJE:
    - OBSTRUKTIVNA MIOKARDIOPATIJA
    - ZMRZNA DIFUZNA HIPERTROFIJA MIOKARDIJA
    - KONGESTIVNA MIOKARDIOPATIJA
- MIOKARDIOPATIJA JE LAHKO: alkoholna, ishemična miokardiopatija
- Miokardiopatije dezimona:
    - DILATATIVNA – alkoholna
    - HIPERTROFIČNA – obstruktivna, neobstruktivna
    - RESTRIKTIVNO – oblitalna
    - LATENTNA MIOKARDIOPATIJA

**30. ZNAKI HIPOVOLEMICNEGA ŠOKA:**

- Tahikardija
- Zmanjšan RR
- Bledica, znojna koža
- Cianoza ustnic
- Oligurija

HIPOGLIKEMIJA - zadah po acetonu, urin ima vonj po acetonu, vsebuje glukozo

**31. GLOBOKA VENSKA TROMBOZA, TROMBOFLEBITIS:**