

Prisluhi so lahko v obliki:

1. pokov
2. pogovorov več oseb
3. ukazov
4. glasbe
5. vse našteto

Kompulzije so izredno pogoste

1. zaznavne motnje
2. ponavljajoča dejanja (npr. vsak dan)
3. motnje spomina
4. prisilne misli
5. motnje inteligentnosti

Med oblike poteka duševne motnje sodi

- a. napad
 - b. umik
 - c. remisija
 - d. kolaps
- d. cirkularne motnje
1. a, b
 2. a, b, c
 3. a, c, d
 4. a, c, d
 5. a, b, c, d

↓
napad
povlec
remisija
kolaps
izredno pogoste

Za antidepressive velja

1. povzročajo odvisnost po daljšem času jemanja
2. samo umirijo bolnika
3. pričnejo delovati po 6-12 mesecih
4. potrebno jih je jemati čim krajši čas
5. povmejo voljo

Psihoterapevtska metoda je

1. hidroterapija
2. psihoanaliza DA
3. terapija s svetlobo
4. ročna dela
5. psihofarmakoterapija

PSIHOANALIZA
- PSIHOTERAPIJA - AKUTNI TRG
KETALE
TERAPIJA S SVETLOBO
TRADICIONALNA
PSIHOTERAPIJA
PSIHOFARMAKOTERAPIJA
KETALE
TERAPIJA S SVETLOBO

Med psihoze NE sodi:

1. shizotipska motnja ✓
2. trajna blodnjava motnja ✓
3. inducirana blodnjava motnja ✓
4. ciklotimija
5. shizoafektivna motnja ✓

Dobro prognozo pri shizofreniji napoveduje:

1. zgodnji začetek
2. brez sprožilnih faktorjev
3. odmaknjeno, avtiistično vedenje
4. samski, ločeni ali vdoveli
5. akutni začetek

Psihotični simptomi se NE pojavljajo pri

1. blodnjavi motnji
2. demenci
3. deliriju

4. depresiji
5. panični motnji

Potek shizofrenije je

1. občasni novi izbruhi bolezní z vmesnim popolnim okrevanjem
2. občasni novi izbruhi bolezní brez vmesnega okrevanja
3. en sam bolezenski izbruh brez posledic
4. stalno slabšanje brez možnosti izboljšanja
5. vse naštete možnosti

V klinično sliko delirija NE sodi:

1. časovna dezorientiranost DA
2. prestrašenost DA
3. povišan krvni tlak
4. konfabulacije DA
5. afazija

DA
KOTI ORIENTACIJE
KOTI
NEPRAVILNOST
KOTI
N. DUCHOVNIH
SPONOV - KONTAKT
A. KOTI VIDA, SLUŠANJA

Simptom, ki ni posledica disfunkcije avtonomnega živčevja pri deliriju je

1. znojenje
2. obsesija
3. zvečan krvni tlak
4. midriaza
5. inkontinenca

V kognitivne funkcije NE sodi →

1. orientacija
2. spomin
3. pozornost
4. psevdohalucinacije
5. računanje

psihološki
spomin
pozor
haluc
račun

Primitivni refleksi se pri demenci tipično pokažejo

1. v poznem stadiju
2. v srednjem stadiju
3. v začetku bolezní
4. so posledica halucinacij
5. so posledica travm v otroštvu

Izmed naštetih je najpomembnejši dejavnik tveganja za depresijo

1. predhodne depresije
2. revščina
3. nizka izobrazba
4. ženski spol
5. žalovanje

Za depresijo velja:

1. je posledica premajhne zaposlenosti in pomanjkanja interesov
2. depresijo lahko premaga z voljo vsakdo sam
3. mine po dopustu
4. je pogostejša pri telesno bolnih
5. pri starejših je koristno prenehati z antidepressivi, ker imajo veliko zdravil